

CORIDA® / ADENTIS®



Conține: 750 g/kg tribenuron-metil

Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)

Erbicid selectiv, cu acțiune sistemică pentru combaterea postemergentă a buruienilor cu frunza lată din culturile de cereale de toamnă și primăvară

Beneficiile oferite de CORIDA®

- Formulare ușor de manipulat
- Fără efecte de solidificare
- Control eficient al buruienilor cu frunza lată
- Doză foarte mică
- Fără restricții asupra culturilor ce urmează în rotație

Mod de acțiune: CORIDA® este un erbicid sulfonilureic, selectiv, sistemic, cu aplicare postemergentă, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de cereale. Produsul este absorbit prin frunze și rădăcini după care este translocat rapid în întreaga plantă. Acesta inhibă diviziunea celulară, producând astfel încetarea creșterii și dezvoltării buruienilor. Creșterea buruienilor este oprită după câteva ore de la aplicare, simptomele vizibile apar după 5 - 10 zile, iar moartea acestora se produce după 2-3 săptămâni de la aplicarea tratamentului. Este important să existe o bună acoperire a culturii cu soluția de stropit.

Recomandări de utilizare

Culturi	Agentul dăunător	Doza (g/ha)	Utilizare	Timp de pauză
Cereale de toamnă și primăvara (grâu și orz)	Buruieni dicotiledonate Aethusa cynapium (pătrunjel câinesc), Anagallis arvensis (scânțieută), Anthemis arvensis (romaniță de câmp), Arabidopsis thaliana (gâscariță), Brassica napus (rapiță, samulastră), Cardamine hirsute (râjnică), Cerastium spp (rocoina/ struna cocoșului/ cornuț de munte), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Centaurea cyanus (albăstrea), Chenopodium album (spanac sălbatic), Chrysanthemum sp (vetricea), Cirsium arvense (pălămidă), Daucus carota (morcov sălbatic), Descurainia Sophia (voinicică), Galium aparine (lipicioasă), Fumaria officinalis (fumăriță), Geranium sp. (geranium), Lamium purpureum (urzică moartă), Matricaria sp (mușețel), Myosotis arvensis (nu-mă-uita), Papaver rhoeas (mac roșu), Polygonum sp. (troscot), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Stellaria media (rocovină), Viola sp. (trei-frați-pătați), Veronica sp. (ventricică/ șopârlița/ șopârliță), Thlaspi arvense (punguliță).	15-20 g/ha	Număr de tratamente/an: 1 <u>Cereale:</u> se aplică de la apariția primului nod format până la apariția frunzei stindard (BBCH 31-39). <u>Buruieni:</u> se aplică primăvara în faza de creștere intensă a buruienilor, până în faza de 6 frunze complet formate. Volumul de soluție: 200 - 400 l/ha.	30 zile, însă nu este cazul dacă se utilizează până în faza recomandată BBCH 39. Timpul de pauză este acoperit de perioada de vegetație.