

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

# FUNGITANE 80 WP

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO  
MANCOZEB

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE  
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS  
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES  
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



### USO AGRONÓMICO:

**MODO DE ACCIÓN:** FUNGITANE 80 WP es un fungicida ditiocarbamato formulado como polvo mojable. Este producto actúa por contacto en la prevención y control de las enfermedades fungosas.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Al aplicar FUNGITANE 80 WP debe asegurarse que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso y debidamente calibrado con agua. Utilice un equipo de aplicación que asegure un recubrimiento completo de la planta. La aplicación de este producto, puede realizarse con equipo terrestre y de mochila. El tipo de boquillas recomendable a usar es de cono hueco, que produce gotas finas. Mientras la persona manipule el FUNGITANE 80 WP debe utilizar el equipo de protección adecuado como son: guantes, zapatos o botas, mascarilla de seguridad con respiración y filtros.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Siempre usar solución recién preparada cada vez que se requiera. El producto diluido es apropiado para aplicarlo en cualquier tipo de rociador. Use suficiente agua para obtener un perfecto cubrimiento (generalmente de 200 a 1,000 litros de agua por hectárea para equipo terrestre y 50 a 80 L/ha para equipo aéreo). Al preparar la mezcla, agregue lentamente el producto al tanque con el sistema de aplicación trabajado, o bien hágase una premezcla, en una cubeta por separado y agréguese al tanque con el sistema de agitación trabajado. Durante la aplicación manténgase la agitación, para conservar el FUNGITANE 80 WP. El polvo se debe preparar por mezcla y dilución del FUNGITANE 80 WP con piro flita o cualquier otro diluyente neutro.



### RECOMENDACIONES DE USO EN GUATEMALA:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS kg/ha	INTERVALO
Banano y plátano <i>Musa spp</i>	Sigatoka negra y amarilla <i>Mycosphaerella fijiensis</i> , <i>Mycosphaerella musicola</i>	2 kg/ha	10 a 14 días según condiciones climáticas

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 7 días.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas después de aplicado el producto.

### FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad si es aplicado a las dosis adecuadas.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, incompatible con productos de fuertes reacción alcalina.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transportar ni almacenar este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacénese en su envase original, con su etiqueta y panfleto, en un lugar seguro y en un ambiente fresco y bien ventilado. En caso de derrame, utilice algún material absorbente, como aserrín

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS  
DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL  
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO**



**BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE  
ROPA LIMPIA**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica, contracción de pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa, nasal, debilidad severa, micción, defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Si ha ingerido el producto, y la persona está consciente, con supervisión médica siempre que sea posible, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

**POR INHALACIÓN:** Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cambie la ropa, manténgala abrigada y en reposo.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO  
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No existe un antídoto específico disponible. Se debe administrar ácido ascórbico por vía intravenosa. Aplicar tratamiento sintomático del paciente.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

**Guatemala**

Centro de Información y

(502) 2232-0735

Asistencia Toxicológica.....2251-3560

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**

Este producto es tóxico para peces, y vida silvestre en general. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. No contamine ríos, lagos, y estanques con este producto con envases o empaques vacíos.

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases, empaques o desechos pueden ser incinerados a altas temperaturas en lugares autorizados para este fin, a través de centros de acopio de las localidades. Los remanentes de productos deben mantenerse en su envase debidamente cerrados con su etiqueta original.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA  
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS  
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El formulador y distribuidor garantizan el contenido de este envase, conforme a la composición porcentual, así como las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta, pero con su manejo y uso está fuera de nuestro control y no se hace responsable de los resultados que con este producto se obtengan.

Formulador: **Agria, S.A.**

Asenovgradsko Shose 4009 Plovdiv, Bulgaria

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Guatemala:**



**agrocentro, s.a.**

14 Calle 3-01, Zona 9, Guatemala, Ciudad

Tel: (502) 2381-2381 Fax: (502) 2331-4049

**PAIS  
GUATEMALA**

**NUMERO DE REGISTRO  
687-14**

**FECHA DE REGISTRO  
02-02-15**