


 ដំណើរការចំបងនៃសកម្មភាពចម្រុះរបស់ថ្នាំអាចកំចាត់ជំងឺផ្សិតនិងបាក់តេរី គឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដំណាំទៅនិងជំងឺផ្សិតបានល្អ និងការពារដំណាំមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

 បង្កើតលក្ខណៈបែតងបានយូរគឺជាសកម្មភាពដែលផ្តល់ដោយZn និង Cuនិងរក្សាទុកក្នុងសរីរាង្គ ដំណាំសំរាប់ការពារដែលមានរយៈពេលយូរក្នុងដំណាំបានល្អប្រសើរ ។

 អ៊ីយ៉ុងទង់ដែងត្រូវបានស្រូបដោយស្លឹកនៃបាក់តេរី និងមេរោគផ្សិត(Phytopathogenic fungi)ជ្រាប ចូលក្នុងកោសិកាផ្សិតនិងបាក់តេរីទាំងសរីរូបសាស្ត្រ និងជីវិតីមី ព្រមទាំងបញ្ឈប់នូវការរីកសាយជំងឺទាំង អស់នេះ អ៊ីយ៉ុងទង់ដែងក៏អាចកំទេចពួក(Mycelium and Spores)របស់ពពួកផ្សិត និងពពួកបាក់តេរី ។

 Zineb កំចាត់និងការពារដំណាំពីការចំលងជំងឺ និងបាក់តេរីផ្សេងៗទៀត



ប្រភេទជំងឺ	ប្រភេទជំងឺលើដំណាំ និងកំរិតនៃការប្រើប្រាស់
ស្វាយ ម្សៅ ធុរ្គី ម្រេច	ជាំខ្មៅលើផ្លែ ស្លឹក និងផ្កា ពពួកបាក់តេរី Xanthomonas citri pv.mangiferaeindicae. បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
បន្លែផ្លែ ពោត សណ្តែក	រលាកស្រទាប់ស្លឹក អុចកងលើស្លឹក ឆេះស្លឹក និងឆ្លុក បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
បន្លែស្លឹក	រលាកស្រទាប់ស្លឹក អុចកងលើស្លឹក ឆេះស្លឹក ផ្សិតសំឡី បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
ក្រូច	ស្នាមក្រម្រើលើ ផ្លែ និងស្លឹក រលួយផ្លែ មែក បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក