

ធាតុសកម្ម : - Chlorimuron Ethyl10%
- Metsulfuron Methyl10%

ពីកាដូ ២០WP គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជំរើសមានលក្ខណៈជ្រាបចូលសន្សឹមៗ កម្ចាត់ស្មៅក្រុមកក់និងស្មៅស្លឹកធំ គ្រប់ប្រភេទ ក្រោយដំណុះគ្រាប់ចាប់ពី ៣-២៥ថ្ងៃ ក្រោយចុះពូជ ត្រូវបានស្មៅស្រូបយកថ្នាំតាមស្លឹក និងរឹស ។

- បរិមាណប្រើប្រាស់ : ០,៣-០,៤ គី.ក្រាម/ហត។
- វិធីលាយ : លាយ ៣ ក្រាម/២០-២៥ លីត្រទឹក។
- បរិមាណទឹកបាញ់ : ២៥០-៣០០ លីត្រ/ហត។ បាញ់ថ្នាំនៅពេលសាប ព្រោះ ពី ៣-២៥ថ្ងៃ។
- ចំណាំ :
 - អាចលាយជាមួយដី ឬ ដីខ្សាច់ដើម្បីបាញ់ ។
 - រក្សាដីស្រែមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ មុន និង ក្រោយបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ ។



ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជំរើស

ពីកាដូ ២០WP
Picador 20WP

Chlorimuron Ethyl10%
Metsulfuron Methyl10%

មុនសព្វនៃការប្រើ សម្រាប់ស្មៅស្លឹកធំ និងក្រុមកក់គ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំស្រូវ និងស្មៅទីវាលគ្មានដំណាំ។

កម្ចាត់ស្មៅក្រុមកក់ និងពពួកស្មៅស្លឹកធំដើម្បីឱ្យ គ្រប់ប្រភេទ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

