



CORIDA®

Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 72,30% (p/p) de tribenurão-metilo (na forma de éster metílico) correspondendo a 75% de tribenurão-metilo

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Herbicida seletivo para controlo de infestantes dicotiledóneas em pós-emergência de trigo e cevada.

Autorização de venda n.º 1371 concedida pela DGAV

Conteúdo: 50 g

Um produto: Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD
75-83 Dimitar Manov Str., Sofia 1408, Bulgária
Telef.: 00 34 359 2 9150500

Distribuído por:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 - Contém tribenurão. Pode provocar uma reação alérgica.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102 - Manter fora do alcance das crianças.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P391 - Recolher o produto derramado.

P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 - Não poluir contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe2 - Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar este produto em solos drenados artificialmente.

SPe3PT2 - Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às zonas não cultivadas. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 5 metros em relação às zonas não cultivadas.

SPe3PT3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 18-20 metros em relação às águas de superfície, incluindo 18-20 metros de coberto vegetal.

SPoPT4 - O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e a aplicação do produto.

SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Armazenar a uma temperatura não superior a 35°C.

Intervalo de segurança: 60 dias em cevada e trigo.

CORIDA® é um herbicida residual, sistémico, com absorção foliar e radicular, sendo mais eficaz nos primeiros estados de desenvolvimento, quando estas se encontram num período de vegetação activa. É indicado para o combate das infestantes dicotiledóneas em trigo e cevada. Contém a substância ativa tribenurão-metilo, pertencente à família química das sulfonilureias, atuando através da inibição da biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (inibindo a actividade da enzima acetolactato sintase, ALS).

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

TRIGO e CEVADA

Infestantes dicotiledóneas: 15 a 20 g/ha.

Tratar no final da primavera, do início do alongamento do colmo (primeiro nó pelo menos 1 cm acima do nó do afilhamento) até ao estado de folha bandeira (BBCH 31 a BBCH 39), e quando as infestantes se encontrem em crescimento ativo, a partir das 6 folhas verdadeiras.

Realizar no máximo 1 aplicação por ano.

Volume de calda a utilizar: 200 a 400 L/ha.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Orelha-de-rato (*Cerastium glomeratum*), Verónica-da-Pérsia (*Veronica persica*), Erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), Catassol (*Chenopodium album*), Corriola-bastarda (*Polygonum convolvulus*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Bolsa-do-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), Crizandra-dos-montes (*Diplotaxis muralis*), Amor-de-hortelão (*Galium aparine*), *Geranium* sp., Papila-pontuda-alaranjada (*Glaucium corniculatum*), Lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), Papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), Morugem-branca (*Stellaria media*), Verónica-dos-campos (*Veronica arvensis*).

INFESTANTES RESISTENTES

Matricaria sp., *Chrysanthemum* sp.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- **CORIDA®** contém tribenurão-metilo, inibidor da enzima ALS, classificado com o código HRAC grupo B. A aplicação repetida de produtos com o mesmo modo de ação nos mesmos locais durante anos consecutivos pode conduzir à ocorrência de fenómenos de resistência. Para evitar a ocorrência de fenómenos de resistência, deve-se proceder à alternância ou à mistura deste produto com produtos possuindo diferente modo de ação.
- No caso de se verificar a ocorrência de resistência, informar o distribuidor e a Autoridade Fitossanitária Nacional e empregar um método alternativo de controlo das infestantes.
- **CORIDA®** não provoca quaisquer efeitos negativos em culturas de rotação, desde que semeadas ou plantadas no ano seguinte à aplicação do produto. Até 3 meses após a aplicação do produto, apenas é recomendável a sementeira de cereais.
- Evitar o arrastamento da calda durante a aplicação do produto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda a utilizar: 200 a 400 L/ha.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 808 250 143.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Este produto deve utilizar-se exclusivamente para os usos e condições descritas neste rótulo. O utilizador é responsável por eventuais danos que possam decorrer do uso indevido do produto. O respeito de todas as condições descritas neste rótulo é condição essencial para assegurar a eficácia do tratamento e para evitar danos nas plantas, pessoas e animais.

Lote n.º:

Data de fabrico:

Edição 1