



CORIDA®

Herbicida sistémico y selectivo para el control de malas hierbas de hoja ancha en cultivos de cereales en forma de granulado dispersable en agua (WG).

COMPOSICIÓN

Tribenuron-metil . . . 75% p/p (750 g/kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N° ES-00877

CONTENIDO NETO: 50 gr.

Fecha de fabricación / N° de lote.: ver envase

Fabricante y titular de la inscripción: Zentih Crop Sciences Bulgaria Ltd. c/ Dimitar Manov 75-83 (Triaditsa) 1408 Sofia (Bulgaria)

Distribuidor:

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.



H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P391: Recoger el vertido.

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

- En caso de Ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto urinario.
- Náuseas, vómitos y diarrea.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador: El aplicador utilizará, tanto en la mezcla/carga como en la aplicación; guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

Seguridad del trabajador: El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada: mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Mitigación de riesgos medioambientales:

- SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
- SPe1: Para proteger las aguas subterráneas, aplicar el producto o cualquiera que contenga tribenuron cada dos o tres años.
- SPe3: Para la protección de los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 18-20 m con cubierta vegetal, hasta a masas de agua superficial.
- SPe3: Para la protección de las plantas no objetivo respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 10 m, hasta la zona no cultivada; o una banda con cubierta vegetal de 5 m y boquillas de reducción de deriva del 50%, hasta la zona no cultivada.

Almacenamiento y eliminación

- No almacenar el producto a una temperatura superior a 35 °C.

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

CORIDA® es un herbicida sistémico y selectivo para el control de malas hierbas de hoja ancha en cultivos de cereales (trigo y cebada) al aire libre, mediante pulverización mecánica dirigida al suelo.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Volumen de caldo	Momento de aplicación
Trigo y cebada	Malas hierbas de hoja ancha	10-25 g/ha (1 aplicación)	200-400 L/ha	Aplicar mediante pulverización entre los estadios BBCH 31-39. No aplicar en BBCH >39. Dosis mínima efectiva para <i>Diploaxis muralis</i> : 12,5g s.a./ha; Dosis mínima a efectiva para <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Stellaria media</i> y <i>Veronica persica</i> : 15 g s.a./ha

- Malas hierbas sensibles: *Cerastium glomeratum*, *Chenopodium album*, *Diploaxis muralis*, *Fumaria officinalis*, *Fallopia convolvulus*, *Veronica persica*.
- Malas hierbas moderadamente sensibles: *Capsella bursa-pastoris*, *Galium aparine*, *Geranium sp.*, *Glaucium corniculatum*, *Lamium purpureum*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Stellaria media*, *Veronica arvensis*.
- Malas hierbas moderadamente resistentes: *Matricaria sp.*
- Malas hierbas resistentes: *Chrysanthemum sp.*

CONDICIONES GENERALES DE USO

- No usar el producto cuando el cultivo esté sometido a estrés por frío, sequía, daños de parásitos, carencia de elementos nutricionales, etc.
- No utilizar el forraje de cereales tratados para la alimentación del ganado.
- No almacenar el producto a una temperatura superior a 35° C.

GESTION DE RESISTENCIAS

Para prevenir o retrasar el desarrollo de la resistencia de las malas hierbas, alternar la aplicación de este herbicida con la de herbicidas con diferentes modos de acción y adoptar prácticas agronómicas adecuadas de control de malas hierbas, como la rotación de cultivos, la falsa siembra, medidas mecánicas.

Se deben llevar a cabo evaluaciones periódicas para monitorizar la posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas a **CORIDA®** y se debe informar a las autoridades locales pertinentes en caso de sospecha de resistencia.

CULTIVOS ROTATORIOS

En caso de fallo del cultivo, sólo sembrar directamente Avena sativa. Para otros cultivos debe respetarse un periodo de espera de 70 a 110 días después de la aplicación.

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre la aplicación del producto y la cosecha del cereal deberán transcurrir al menos 60 días.

ADVERTENCIA AL USUARIO

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.