

AGRIA MANCOZEB 80 WP

Permban: Mancozeb 80%
Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

Fungicid kontakti me veprim pambrojtës në luftimin e semundjeve të ndryshme kerpudhore si: vrugjet, kromat, antraknozat, septoriozat, alternariozat, ndryshqet, fusariozat, pitiumet e të tjera. Në sajë të përbajtjes në formule të joneve magnez dhe zink ka veprim të dukshëm në stimulimin e masës vegetative dhe proceseve të fotosintezës.

Klasa 2, XI
IDËMSHËM, IRRITUES



N - I DËMSHËM PËR
MJEDISIN



20 x 500gr

Frazat e rezikut: R37, R43, R50/53.
Frazat e sigurisë: S2, S36/37, S46, S61.

Kulturat	Semundja	Dosja: g/100 litër ujë	Nr. aplikime të tregjuesve	Koha e tregjuesve
Vrejtat	<i>Phytophthora viticola</i>	150-200	4	Trajtimi fillonë kur lulet arin 10 ditë pas shpërthimit të veshëve e deri në 2-3 ditë më.
	<i>Phytophthora viticola</i>	200-250	2	Trajtimi fillonë kur lulet arin 10 ditë pas shpërthimit të veshëve e deri në 2-3 ditë më.
Domate Specja Patilixhan	<i>Phytophthora</i> <i>Septoria lycopersici</i> <i>Alternaria</i> <i>Cladosporium chlamydosporium</i> <i>Cladosporium fulvum</i> <i>Pseudomonas</i> spp. <i>Motonomonas tomativora</i>	200	4	Trajtimi fillonë menjëherë pas trajtimit dhe vazhdojë gjatë gjithë vegetacionit sipas intensitetit të semundjes duke u përsëritur çdo 7 ditë dhe.
Trangull	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Cladosporium</i> <i>Leguminaria</i> <i>Cladosporium cucumerinum</i>	200	4	Trajtimi fillonë me konstantim e shpërfaqet në para dhe përsëritet çdo 7-10 ditë në varësi të intensitetit të semundjes.
Laker loka	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Peronospora brassicae</i>	200	4	Trajtimi fillonë me konstantim e shpërfaqet në para dhe përsëritet çdo 7-10 ditë në varësi të intensitetit të semundjes.
Qepë hadra Presh	<i>Alternaria</i> spp. <i>Puccinia allii</i> <i>Peronospora brassicae</i> <i>Biorhiza</i> spp.	200-250	4	Trajtimi fillonë me konstantim e shpërfaqet në para dhe përsëritet çdo 7-10 ditë në varësi të intensitetit të semundjes.
Paste	<i>Phytophthora infestans</i>	200	4	Trajtimi fillonë kur bima arrin lulet dhe përsëritet çdo 7-10 ditë në varësi të intensitetit të semundjes.
Sallate	<i>Biorhiza lactucae</i>	200	2	Trajtimi fillonë me shpërfaqje të kompozuar në para dhe përsëritet pas 7 ditëve.
Leguminozë	<i>Cronyera</i> spp. <i>Colletotrichum</i> spp. <i>Peronospora</i> spp. Pihulum spp. <i>Fusicladium</i> spp. <i>Bioletia</i> spp. <i>Botrytis cinerea</i>	200	4	Trajtimi fillonë me konstantim e shpërfaqet në para dhe përsëritet çdo 7-10 ditë në varësi të intensitetit të semundjes.
Agrumë	<i>Cladosporium</i> <i>Gliosporium</i> <i>Phytophthora</i> spp. <i>Capsofillium</i> spp. <i>Sclerotium</i> spp.	250	4	Trajtimi fillonë me shpërfaqje të kompozuar në para dhe përsëritet pas 7 ditëve.
Frutet Fares (Mellë, Dardhë)	<i>Tomaria imrayana</i> <i>Fusicladium</i> <i>Septoria</i> spp.	250	4	Trajtimi fillonë në jeshilim të barisave, ndërkohë në lulet dhe vazhdojë gjatë gjithë vegetacionit.
Wetshence (Kajsi,qershi, Peshkë, Kumbulli)	<i>Stigmata carpae</i> sp. kulla	200-250	4	Trajtimi fillonë në bimën në rritje, ndërkohë në lulet dhe vazhdojë gjatë gjithë vegetacionit.

Masat mbrojtëse:

- Mbrojtjen në vend të sigurt, larg femijeve, ushqimeve të njerezve dhe kafsheve, ujit të pijshëm.
- Gjate punës mos hani dhe mos pini lengje e duhan.
- Gjate punës vishni robat e punës, pajisjet mbrojtëse për sytë dhe fytyrën (doreza, syzet, mbrojtësen e fytyrës, etj.).
- Mbas mbarimit të punës lani pajisjet mbrojtëse, mjetet e sperkatjes.
- Asgjësoni ambalazhet sipas ligjeve në fuqi.

Magazinimi: Ruajeni në ambalazhin original, në vende të thata e të ajrosura, të shmangura nga rezet direkte të diellit dhe në temperatura nën 38 C.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe keshillat për mjekun

- Në rast kontakti me lekuren, lajeni me ujë të bollshëm dhe me sapun.
- Në rast kontakti me sytë, lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe konsultojuni me mjekun.
- Në rast gëlltjeje, kerkoni menjëherë ndihmë mjekësore në qendrën shpitalore me të afërt.
- Në rast demtimi, largojeni pacientin nga zona e rezikut. Nëse i demtuar ka humbur ndjenjat, shtrijeni dhe transportojeni në pozicion anesor. Hiqini menjëherë robat e ndotura. I tregojni mjekut etiketën e preparatit.

Numri dhe data e regjistrimit: 441; 16/3/2012

Data e prodhimit: 04. 2014
Afati i ruajtjes: 36

Z Prodhuës:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

Importues:
Tel: 0692053078

AGR SHEGAJ sh.p.k.
Shkoder

AGRIA MANCOZEB 80 WP

Permban: Mancozeb 80%
Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

Fungjicid kontakti me veprim parambrojtes ne luftimin e semundjeve te ndryshme kerpudhore si: vrugjet, kromat, antraknozot, septoriozat, alternariozat, ndryshqet, fusariozat, pitiumet e te tjera. Ne saje te pembajtjes ne formule te joneve magnez dhe zink ka veprim te dukshem ne stimulimin e mases vegetative dhe proceseve te fotosintezes.

Klasa 2, XI
I DEMSHEM, IRRITUES



N - I DEMSHEM PËR
MJEDISIN



40 x 250gr

Frazat e rezikut: R37, R43, R50/53.
Frazat e sigurise: S2, S36/37, S46, S61.

Kultura	Semundja	Konc. gj/100 litra uj	Ne munda e aplikimit	Koha e aplikimit
Veshtrat	Phytophthora viticola	150-200	4	Trajtimet fillojne kur lulet arin 10
	Phytophthora viticola	200-250	2	Trajtimet me Aseptolium te pjellorave duhet arin 3-4 ditet.
Domate Speca Peshqiu	Phytophthora infestans Septoria lycopersici Alternaria spp. Colletotrichum jasmoides Cladosporium fulvum Peronospora spp. Fusicoccum verruculosa	200	4	Trajtimet fillojne menjehere pas mungimit dhe vaktitjes gjate gjithe vegeracionit sipas intensitetit te semundjeve date te permesuara cdo 7-10 dite.
	Peronosporoza Colletotrichum Fusicoccum Cladosporium aspergillum	200	4	Trajtimet fillojne me konstantem e shpejtes ne pare dhe permes cdo 7-10 dite ne varset te intensitetit te semundjes.
Laker koke	Alternaria spp. Peronospora Peronospora aspergillum	200	4	Trajtimet fillojne me konstantem e shpejtes ne pare dhe permes cdo 7-10 dite ne varset te intensitetit te semundjes.
Qepe baltre Peshq.	Alternaria spp. Peronospora Peronospora Botrytis spp.	200-250	4	Trajtimet fillojne me konstantem e shpejtes ne pare dhe permes cdo 7-10 dite ne varset te intensitetit te semundjes.
Paste	Phytophthora infestans	200	4	Trajtimet fillojne kur blota arin lartesis 20-30 cm dhe permes cdo 7-10 dite ne varset te intensitetit te semundjes.
Sallate	Bremia lactucae	200	2	Trajtimet fillojne me shpejtes e konstantem e pare dhe permes cdo 7-10 dite.
Leguminoze	Alternaria spp. Colletotrichum spp. Peronospora spp. Phytophthora Fusicoccum spp. Botrytis cinerea	200	4	Trajtimet fillojne me konstantem e shpejtes e pare dhe permes cdo 7-10 dite ne varset te intensitetit te Semundjes.
	Colletotrichum Cladosporium Phytophthora spp. Cephusium spp. Septoria spp.	250	4	Trajtimet fillojne me shpejtes e konstantem e pare dhe permes cdo 7-10 dite.
Agrume	Fusicoccum Fusicoccum Mulle Dutiba	250	4	Trajtimet fillojne ne pjellimin e barozes, ndersiper ne lulet dhe vaktitjes gjate gjithe vegeracionit.
	Botrytis (Ruzh-qerthi, Peshqia, Kaqibali)	200-250	4	Trajtimet fillojne ne barozet eose, ndersiper ne lulet dhe vaktitjes gjate gjithe vegeracionit.

Verejtje per perdorimin:

Ne fillim perzihet preparati me pak uj dhe kur te jete homogjenizuar mire shohet sasia tjetere e ujit. Normal e perdorimit te ujit levizin 200-2000 litra sipas kulturave dhe stadeve vegetative. Nuk perzihet me vajra minerale dhe produkte alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk eshte fitotoksik kur perdozet ne kulturat e mesiperme dhe sipas dozave te rekomanduara.

Koha e prithshmerise (karenca):

Rush 28 dite; domate, speca, patllixhan, trangull, pjeper 14 dite ne fushe dhe 7 dite ne sera; laker 21 dite; sallate 14 dite; patate 7 dite; qepe 28 dite; agrume 14 dite; fruta farore e berthamore 28 dite.

Ndikimi ne ekosistem:

Pak helmues per bletet. Helmues per peshqit. Helmues per jorevretorbet ujore. Mos ndotni ujt me preparatin ose me ambalazhin e tij.

Antidot specifik nuk njihet. HELMUES PER PESHQIT DHE ORGANIZMAT UJORE.

Masat mbrojtese:

- Mbjani ne vende te sigurta, larg femijeve, ushqimeve te njerezve dhe kafsheve, ujit te pijshem.
- Gjate punes mos hani dhe mos pini lengje e duhan.
- Gjate punes vishni robat e punes, paisjet mbrojtese per syte dhe fytyren (doreza, shtet, mbrojtlesen e fytyres, etj.).
- Mbas mbarimit te punes lani paisjet mbrojtese, mjetet e sperkatjes.
- Asgjeson ambalazhet sipas ligjeve ne fuqi.
- Magazini:** Ruajeni ne ambalazhin origjinal, ne vende te thata e te ajrosura, te shmanjura nga rezet direkte te diellit dhe ne temperature nen 38 C.
- Udhhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun**
- Ne rast kontakti me lekuren, lajeni me uje te bollshem dhe me sapun.
- Ne rast kontakti me syte, lani menjehere me uje te bollshem dhe konsultojuni me mjekun.
- Ne rast gellitjeje, kerkoni menjehere ndihme mjekesore ne qendren spitalore me te afert.
- Ne rast demtimi, largojeni pacientin nga zona e rrezikut. Nese i demtuari ka humbur ndjenjat, shtrijeni dhe transportojeni ne pozicion anesor. Hiqini menjehere robat e ndotura. I tregoni mjekut etiketen e preparatit.

Numri dhe data e regjistrimit: 441; 16/3/2012

Data e prodhimit: 04. 2014

Afati i ruajtjes: 35

Z Prodhues:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

Importues:
Tel: 0692053078

AGR SHEGAJ sh.p.k.
Shkoder