

**ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ**

**သတိပြုရန်**

- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ရုပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ မျက်ကာမှန်၊ အနားကျယ်သောဦးထုပ်၊ မျက်နှာဖုံးနှင့် အကာအကွယ် အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။
  - မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
  - ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
  - ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆပ်ပြာနှင့် ဂရတစိုက်စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်နေလျှန်းပြီးမှ ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မှ မဖျန်းရ။
- အဆိပ်သင့်မှု -** ရေနေသတ္တဝါတို့အား အဆိပ်သင့်မှုပြင်းထန်စေသည်။

**သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း**

- အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးခွံကို အဖုံးတင်းကြပ်စွာပိတ်၍ သိုလှောင်ပါ။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
- ဆေးဘူးခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရပါ။ ထုမြေဖျက်ဆီး၍ မြေကျင်းနက်နက်တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများကို မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် မြောင်းများသို့ မစွန့်ပစ်ရ။ မဆေးကြောရ။ မီးမရှို့ရပါ။
- လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးစေ့၊ ဓာတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသိုလှောင်ရ။

**ရှေးဦးသူနာပြုကုသ်**

- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေသန့်များများနှင့် မြှေးညှင်းညှင်သာစွာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသော အရေပြားအား ရေ ဆပ်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးရှူမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရရှိသောနေရာတွင် ထားပါ။
- ဆေးကို မျိုချမိပါက အန်အောင်မပြုလုပ်ရ။ အညွန့်စားပါသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံနှင့်အတူ နီးစပ်ရာဆရာဝန်ထံ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံး ခံယူပါ။

**မြေဆေး -** မြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာအရ ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် **F2020 - 2181**  
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်  
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ  
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ



**CADILAC 80 WP**  
**ကာဒီးလက်**  
**၈၀ ဒပလျူပီ**  
**ပို့သတ်ဆေး**



- ပါဝင်ပစ္စည်းများ
- အစွမ်းရှိပစ္စည်း - **Mancozeb** ..... 80%
  - အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း - ..... 20%
  - စုစုပေါင်း - ..... 100%
- ဆေးအုပ်စု - **Carbamate**



မြန်မာ့သူ



**ဘရူနိုဗ် ပရိုက်ဇေ(ထ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်**  
( BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED )  
အမှတ်(၅၉/၆၁)၊ (မြို့အမှတ် - E)၊ မဟာဝိဇ္ဇာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် အထွေထွေ စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကင်း၊  
၄၆-၀၉ ၄၀၀၆၈၀၄၅

**ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD**  
75-83, DIMITAR MANOV STR., SOFIA 1408, BULGARIA

**1 kg**

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း: GHS အုပ်စု(၅)



**ဆေးမသုံးစွဲမီ အညွန့်ကို သေချာစွာဖတ်ပါ**

ကာဒီးလက် ၈၀ ဒပလျူပီသည် သီးနှံပင်များတွင် ကျရောက်ချက်ဆီးတတ်သော ပိုးရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော ထိသေအာနိသင်ရှိသည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**အသုံးပြုရန်အညွှန်း**

သီးနှံ	ကျရောက်သည့် ရောဂါ	နှုန်းထား		ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်ပျိုးမှုအတွက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
		ဂရမ်/ဧက	ဂရမ်/ဧက ၂၀ လီတာ	
ပဲတီပိမ်း၊ မတ်ပဲ	ရွက်ပြောက်၊ ခေါင်းနီ၊ မိုရောဂါ	၈၀၀-၁၀၀၀	၁၃၀-၁၆၀	၁၄
ရှောက်မျိုးများ	ချေးဖတ်ရောဂါ၊ မွဲပြောက်စွန်း၊ ကိုင်းဖျားခြောက်ရောဂါ	၂၀၀-၂၅၀	၃၀-၄၀	၂၀
သရက်	မွဲပြောက်စွန်း	၂၀၀-၂၅၀	၃၀-၄၀	၂၀
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား	ခေါင်းနီ၊ မိုရောဂါ၊ မွဲပြောက်စွန်း၊ အစေးထွက်ပင်စည်ခြောက်	၂၀၀-၂၅၀	၃၀-၄၀	၂၀
အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်	စောပင်နာကျရောဂါ	၂၀၀-၂၅၀	၃၀-၄၀	၂၀
ငရုတ်	မွဲပြောက်စွန်းရောဂါ	၂၀၀-၂၅၀	၃၀-၄၀	၂၀
ကြက်သွန်နီ/ဖြူ	ခေါင်းနီ၊ မိုရောဂါ၊ တောက်တိုမြီးရောဂါ	၈၀၀	၁၃၀	၂၀

- တစ်ဧကလျှင် ရေ ၂၀ လီတာထပ်ဆေးဖျန်းပုံ (၆)ပုံနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။
- သီးနှံတစ်ရာသီတွင် ဆေးဖျန်းကြိမ်ရေ(၂-၃)ကြိမ်ထက် ပိုမဖျန်းပါနှင့်။
  - ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၁၀-၁၄)ရက်
  - ဆေးဖျန်းပြီးစိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၄၈)နာရီ
  - ဆေးဖျန်းပြီးနောက် (၆)နာရီခန့်မိုးလွှဲလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။

