

**ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လှုံ့ဖြောင့်သောခတ်သိမ်းဆည်းပါ**

**သတိပြုရန်**

- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ တောင်းဘီရှည်၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ မျက်ကာမှန်၊ အနားကျယ်သောဦးထုပ်၊ မျက်နှာဖုံး စသည့်အကာအကွယ်ဝတ်စုံများကို အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။
- မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
- ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
- ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆပ်ပြာနှင့် ဂရုတစိုက်စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မှ မဖျန်းရ။

**သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း**

- အေးမြမြောက်မြောက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးခွံကို အဖုံးတင်းကြပ်စွာပိတ်၍ သိုလှောင်ပါ။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လှုံ့ဖြောင့်သောခတ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
- ဆေးဘူးခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရပါ။ ထုခြေဖျက်ဆီး၍ မြေကျင်းနက်နက်တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများကို ဖြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် မြောင်းများသို့ စွန့်မပစ်ရ။ မီးမရှို့ရပါ။
- လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးစေ့၊ ဓာတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသိုလှောင်ရ။

**ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း**

- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေများများနှင့် ဖြေးညှင်းညှင်းသာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
  - ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသော အရေပြားအား ရေ၊ ဆပ်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
  - ဆေးရှူမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရရှိသော နေရာတွင် ထားပါ။
  - ဆေးကို မျိုချမိပါက အန်အောင်မပြုလုပ်ရ။ အညွန့်စားပါသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံနှင့်အတူ နှိပ်ရာဆရာဝန်ထံ ဆေးကုသမှု အပြန်ဆုံး ခံယူပါ။
- ဖြေဆေး - ဖြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာအရ ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် **P2018-2180**  
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်  
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ  
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ



BURONOS

**COPFORCE EXTRA 43.95 WP**  
**ကျော့(ပ်)ဖို့(စ်)အိတ်(စ်)ထရာ**

၄၃.၉၅ ဒီပရီမီယမ်



**မို့သတ်ဆေး**

Active Ingredient : **Copper Oxychloride** .... 39.75%  
**Cymoxanil** ..... 4.2%  
Inert Materials : ..... 56.05%  
ဆေးအုပ်စု - **Inorganic+Cyanoacetamide-oxime**



ဖြန့်ချိသူ **ဘရူနိုစ် ပရိုက်ဗေ(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်**  
(BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED)  
အမှတ်(၅၅/၆၁)၊ (ဇြိအမှတ်-E)၊ ဟာဘီဇွတ်ရိလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း

ထုတ်လုပ်သူ **ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD**  
75-83, DIMITAR MANOV STR., SOFIA 1408, BULGARIA

1 kg

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း: GHS အုပ်စု(၅)



**ကျော့(ပ်)ဖို့(စ်)ထရာ ၄၃.၉၅ ဒီပရီမီယမ်**  
မို့သတ်ဆေး

**ကျော့(ပ်)ဖို့(စ်)အိတ်(စ်)ထရာ ၄၃.၉၅ ဒီပရီမီယမ်**

သီးနှံပင်များတွင် ကျရောက်ဖျက်ဆီးတတ်သော ဖို့ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော ထိသေအာနိသင်ရှိမို့သတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

**အသုံးပြုရန်အညွှန်း**

သီးနှံ	ကျရောက်သည့် ရောဂါ	နှုန်းထား		နောက်ဖုံး ဆေးဖျန်းကြိမ်များကို ဖြတ်သိမ်းဖျက်ဆီးရန်အတွက်
		ဂရမ်/ဧက	လီတာ/ဧက	
အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်	စောပင်နုကျော့၊ နောင်ပင်နုကျော့ (လောင်းခဲ)ရောဂါ	၂၅၀-၃၅၀	၄၀-၆၀	၁၄
ပပျစ်	ရွက်ခြောက်ရောဂါ	၂၀၀-၃၀၀	၃၅-၅၀	၁၄
ရှောက်၊ လိမ္မော်	ချေးဖတ်ရောဂါ	၂၀၀-၃၅၀	၃၅-၅၀	၁၄
ကြက်သွန်	တောက်တွဲမြီးရောဂါ	၁၀၀-၂၀၀	၂၀-၃၅	၁၄
ငရုတ်	ဖွဲ့ပြောက်စွန်း၊ ကိုင်းဖျားခြောက်ရောဂါ	၁၅၀-၂၅၀	၂၅-၄၅	၁၄
ဖရုံ၊ သဒ္ဓားဖျား	ရွက်ခြောက်ရောဂါ	၂၀၀-၃၀၀	၃၅-၅၀	၁၄

- သီးနှံတစ်ရာထဲတွင် ဆေးဖျန်းကြိမ်စေ (၂-၃)ကြိမ်ထက် ပိုမဖျန်းပါနှင့်။
- ဆေးဖျန်းခြားရက် (၁၀-၁၄)ရက်
- ဆေးဖျန်းပြီးနောက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ-(၂၄)နာရီ
- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် (၆)နာရီခန့်မို့လွတ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။