

克峻宝[®]

农药登记证号:PD382-2002
产品质量标准号:WQ/359 AGRIA BG01-2018

王铜 · 代森锌

总有效成分含量:52%

代森锌含量: 15%

王铜含量: 37%

剂型:可湿性粉剂

低毒

净含量:10千克
原产地:保加利亚

生产企业名称

保加利亚艾格利亚有限公司

杀菌剂

● 产品性能(用途):

本品为均匀粉末,是由代森锌和王铜复配而成,其中代森锌对多种病菌有较强触杀作用。王铜喷到作物上后能粘附在植物体表面,形成一层保护膜,不易被雨水冲刷,在一定的湿度条件下释放出可溶性碱式氯化铜离子起杀菌作用。本产品广泛应用于防治作物的细菌性病害。于发病前或发病初期使用,效果较佳。

● 使用技术和使用方法:

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
柑橘树	溃疡病	200-300倍液	喷雾

(注:(1)公顷用制剂量=亩用制剂量×15

(2)总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数)

- 1.作物发病前施药,最晚不超过病症初现期。
- 2.本品无内吸性,施药时要均匀周到。
- 3.本品安全间隔期为14天,每季最多使用3次。

● 注意事项:

1. 本品不可与强碱性、强酸性农药混用。不能与含汞化合物、硫代氨基甲酸酯杀菌剂混用。
2. 本品含铜离子,对铜敏感作物禁用。
3. 配药时要防止污染手、脸和皮肤。施药时切勿吸烟、饮食、喝水,必须穿戴防护农具,避免药液接触皮肤和眼睛。施药后要用肥皂和清水彻底清洗手、脸和其他裸露部位。
4. 用药后要按照相关规定处理包装物。在洗涤药械和处理废弃物时不要污染河流、池塘和水源。
5. 孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。

● 中毒急救:

1. 如不慎接触眼睛或皮肤,应用大量清水冲洗15分钟以上。如不慎皮肤接触药液,用大量的清水和肥皂冲洗干净。
2. 代森锌的中毒症状:恶心、呕吐、腹痛、腹泻,重者为头痛头晕、心率呼吸加快,血压下降、抽搐、循环衰竭,甚至呼吸中枢麻痹而死。
3. 误食王铜会引起急性中毒,表现为头痛、头晕、乏力、口腔粘膜呈蓝色,口内有金属味,齿龈出血,舌发青,腹泻,腹绞痛,黑大便,重者昏迷、痉挛,血压下降等。
4. 不慎误服本品,立即催吐、洗胃,对症治疗,忌食油类食物,禁酒。王铜的解毒剂为依地酸二钠钙。

● 储存和运输:

1. 贮运时严防潮湿、日晒,不得与食品、饮料、粮食、种子、饲料等混放。
2. 密封贮存于阴凉干燥、通风处,避光保存于干燥通风处,置于儿童不能触及之处并加锁保存。用毕将铝箔袋口扎紧,以防吸潮结块。

国内办事机构:北京金农华泰咨询发展有限公司
地址:北京市朝阳区麦子店街40号富丽花园1号楼2205室
邮编:100125
电话:010-65075527 传真:010-65075542
质量保证期:2年 生产日期及批号:见包装



B

杀菌剂

