

CUPROSATE GOLD M 72 WP

Lenda vepruese: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%

Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

Fungicid specifik, me veprim te fuqishem e te shpejte sistemi dhe kontakti per luftimin e vrugjeve

Klasi 3, XI
I DEMSHEM, IRRITUES



N - I DEMSHEM PËR
MJEDISIN



20 x 500gr

Frazat e rrezikut: R37, R43, R50/53.
Frrazat e sigurise: S2, S36/37, S46, S61.

Perdorimi: Eshte fungicid sistemi dhe kontakti me veprim te dyfishte, duke frenuar zhvillimin e micelit te kerpudhes (*Cymoxanil*) dhe frenues per mbijen e sporeve te kerpudhave (*Mancozebi*). Perdoret ne trajtimet preventive dhe ne ato kurative. Pas trajtimit Cymoxanil deporton ne indet bimore brenda 6 orave te saje, te levizjes citotropike e translaminare merret nga miceli i kerpudhes duke penguar zhvillimin e micelit, ndersa Mancozebi ka veprim te zjatur te lete biologik si dhe ne saje te permbarjej se Manganit dhe Zingut ka veprim te stimulues mbi mase vegetative.

Ne hardhi: Kunder vrugut (*Plasmopora viticola*), Trajtimet fillinne kur qfaqt reziku i infeksionit nga vrugut, pra kur lastarte kane aritur gjatjesina 10 cm dher kur kemi reshje dha lageshit i kur gjithfushe ne gjelje. Trajtimet ne fazat e para jene gjithashtu te efektueshme edhe kunder Eskorizos. Doza e perdorimit 150-200 gr/100 litr uje. Ne vartesi te infeksionit trajtimet mund te perseriten cdo 7-10 dite. Kryhen deri ne 4 trajime.

Ne domate: Kunder vrugut (*Phytophthora spp*), me 150-200 gr/100 litr uje. Trajtimet perseriten cdo 7-10 dite.

Ne spec: Kunder (*Phytophthora capsici*), me 1.5-2 kg/ha, duke kryer deri 3 trajime pas mbijelljes se fidanit ne fushe.

Ne duhan: Per luttimin e (*Phytophthora spp* dhe *Pemospora tabaccina*), me 200-250 gr/100 litr uje.

Ne bimet zbulukses: Per luttimin e vrugjeve te ndryshme shkaktuar nga kepurndhat e gjinise peronosporae, me 150-200 gr/100 litr uje.

Masat mbrojtese:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa arriteshme nga fumeti.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve per blegtorene.
- Eviton kontaktet zjaturte te syve dhe lekures me preparatin.
- Eviton marjan e preparatit me organjet e frysmaarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkates.
- Gjate perdorimit mos ha e mos pi uje dha duhan.
- Gjate punes perdon paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Ne perfundim te punes lani duart dher pjeset e ekspozuara te trupit, si dher paisjet mbrojtese dher mjetet sperkatese.
- Asiguresi i ambalazheve te behet sipas regullave ne fugi.

Udhëzime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjejkun:

- Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat, luhuni me uje te bolleshem dhe sapun.
- Ne rast thitjje te tretiesres sperkatese me organjet e frysmaarrjes, i aksidentuar cohet ne nje mjejd te ngrohte dher te ajrosur.
- Ne rast helimi, kerkon menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore duke i treguar mjejkut etiketen e keti produkti. Nuk nijhet antidot specifik. Mjejkimi sipas simptomave.

Verejjeje per perdorimin:

- Perzihet me produktet e tjera me perjashtim te atyre me reaksiun alkalin.
- Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar stresse nga temperaturat e uleta, ujja e tepert, thatesire e te tjera.

Ndikimi ne ekosistem:

- Nuk eshte helmues ndaj bleteve
- Eshte helmues ndaj peshqueve prandaj mos ndotni ujrat me kete produkt ose ambalazhet e tij.

Karenca:

10-14 dite per te gjithe kulturat e rekomanduara.

Magazinimi:

Ruhet ne vende te sigurta, pa lageshti, dher ne temperature 5 deri 35 grade celsius

Antidot specifik nuk nijhet.

Fitotoksiciteti: Nuk eshte fitotoksik ne dozat dher kulturat e rekomanduara. Perzihet me shumicen e fungicideve dhe insekticideve perveç atyre me reaksiun alkalin.

HELMUES PER PESHQIT DHE ORGANIZMAT UJORE.

Numri dher e regjistrimit: 446; 16/3/2012

Data e prodhimit: 04. 2014

Afati e rrujties: 32

Prodhues:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

AGR
SHEGAJ

Importues: Shegaj AGR sh.p.k.

CUPROSATE GOLD M 72 WP

Lenda vepruese: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%
Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

Fungicid specifik, me veprim te fuqishem e te shpejte sistemi dhe kontakti per luftimin e vrugjeve



Frazat e rrezikut: R37, R43, R50/53.
Frazat e sigurise: S2, S36/37, S46, S61.

Perdorimi: Eshte fungicid sistemi dhe kontakti me veprim te dyfishte, duke frenuar zhvillimin e micelit te kerpuades (*Cymoxanil*) dhe frenues per mbijeten e sporeve te kerpuadhove (*Mancozebi*). Perdoret ne trajtimet preventive qe ne ato kurante. Pas trajtimit Cymoxanil deperton ne indet bimore brenda 6 orave dhe, ne saje, te levizjet citotropike e translaminare merret nga miceli i kerpuades duke penuar zhvillimin e micelit, ndersa Mankozebi ka veprim te zgjatur dhe te larte biologik si dhe ne saje te permbytjes se Mangantit dhe Zingut ka veprim te larte stimulues mbi mosen e zjarrve.

Ne hardhi: Kunder vrugut (*Plasmopora viticola*). Trajtimet fillojne kur cfaqet reziku i infektionit nga vrugti, kur lastarja kane aritur gjatjesse 10 cm dhe kur kemi reshje dhe lageshit i te mjafueshme ne gjelje. Trajtimet ne fazat e pare Jane gjithashtu te efektueshme edhe kunder Eskorizos. Doza e perdorimit 150-200 gr/100 litr uje. Ne vartesi te infektionit trajtimet mund te presenten cdo 7-10 dite. Kryhen deri ne 4 trajime.

Ne dome: Kunder vrugut (*Phytophthora spp*), me 150-200 gr/100 litr uje. Trajtimet perseriten cdo 7-10 dite.

Ne spec: Kunder (*Phytophthora capsici*), me 1.5-2 kg/ha, duke kryer deri 3 trajime pas mbajelljes se fidantit ne fushe.

Ne duhan: per lutumin e (*Phytophthora spp* dhe *Peronospora tabacina*), me 200-250 gr/100 litr uje.

Ne bimet zbukuruese: Per lutumin e vrugjeve te ndryshme shkaktuar nga keputdhat e gjinisë peronosporae, me 150-200 gr/100 litr uje.

Masat mbrojtëse:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa arriteshme nga femjeti.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve per blegtorene.
- Eviton kontaktet zgjatura te syve dhe lekures me preparatin.
- Eviton marin e preparatit me organet e fyrmermarjeve gjate preqitjes se solucionit spektes dhe gjate sperkjasës.
- Gjate perdorimit mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Gjate punes perdor pjesë mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Ne perfundini te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit, si dhe paisjet mbrojtëse dhe mjetet spektese.
- Asigusini i ambalazheve te behet sipas regullave ne fuqi.

Udhëzime per ndihmamen e pare keshilla per mjejkun:

- Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat, luhuni me uje te bolleshem dhe sapun.
- Ne rast thithje te tretiesres spektese me organet e fyrmermarjeve, i aksidentuar cohet ne nje mjejd te ngrohet dhe te ajrosur
- Ne rast helmimi, kerkon menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore duke i treguar mjejkut etiketten e keti produkti. Nuk rrijhet antidot specifik. Mjejkimi sipas simptomave.

Verejtje per perdorimin:

- Perzihet me produktet e tjera me perjashjes te atyre me reaksion alkalin.
- Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar stresje nga temperaturat e uletë, uitja e tepert, thatesire e te tjera.

Ndikimi ne ekosistem:

- Nuk eshte helmuves ndaj bleteve
- Eshte helmuves ndaj peshqeve prandaj mos ndotni ujrat me kete produkt ose ambalazhet e tij.

Karenca:

- 10-14 dite per te gjithe kulturat e rekonomanduara.

Magazinimi:

Ruhet ne vende te sigurta, pa lageshti, dhe ne temperature 5 deri 35 grade celsius

Antidot specifik nuk rrijhet.

Fitoloksiciteti: Nuk eshte fitotoksik ne dozat qe dene kulturat e rekonomanduara.

Perzihet me shumicen e fungicideve dhe insekticideve perveç atyre me reaksiuni alkalin.

HELMUES PER PESHQIT DHE ORGANIZMAT UJORE.

Numri dhe data e regjistrimit: 446; 16/3/2012

Data e prodhimit: 04. 2014

Afati i rrujties: 31


Prodhues:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com


AGR
SHEGAJ

Importues: Shegaj AGR sh.p.k.