

**ထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။**

ဂျူးဝက် ၅၅၀ အီးစီ ရေဖျော်ပိုးသတ်ဆေးရည်သည် သီးနှံများစွာတွင် ကျရောက်သောဖျက်ပိုး အမျိုးမျိုးတို့အား ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းပေးနိုင်ရန် နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ လိပ်ပြာဖလံအုပ်စုဝင်ပိုးများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်နိုင်ပါသည်။

**သုံးစွဲရန်အညွှန်း**

သီးနှံ	ဖျက်ပိုး	နှုန်းထား		ဆေးဖျန်းပြီးနောက် ရိတ်သိမ်းမှုဆောင်ရွက်ရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
		စိစိ/ဧက	စိစိ/၅၀ လီတာ	
ဝါ	သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ရွက်စားပိုး	၁၆၀-၂၀၀	၃၅-၄၀	၁၂-၁၄
စပါး	ဆစ်ပိုး၊ ငမြောင်တောင်	၂၀၀-၂၅၀	၄၀-၅၀	၁၀
မြေပဲ	ငမြောင်တောင်၊ အကြေးပိုး	၁၆၀-၂၀၀	၃၅-၄၀	၁၄
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ပဲပုပ်	သီးထိုးပိုး၊ ပွင့်ထွေးပိုး၊ ငမြောင်တောင်	၁၆၀-၂၀၀	၃၅-၄၀	၁၄
အာလူး၊ ငရုတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်	ဝါယာပိုး၊ အကြေးပိုး၊ လိပ်ပြာဖြူ	၁၆၀-၂၀၀	၃၅-၄၀	၁၄
လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပရာ	ရွက်ထွင်းပိုး၊ အကြေးပိုး	၁၆၀-၂၀၀	၃၅-၄၀	၁၄

တစ်ဧကလျှင် (၂၀)လီတာခွက် ဆေးဖျန်းပုံး (၅)ပုံးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။

- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - ၁၂ နာရီ
- ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၁၀-၁၄)ရက်
- သီးနှံတစ်ရာသီတွင် ပက်ဖျန်းနိုင်သောအကြိမ်ရေ - (၂-၃)ကြိမ်

ဂျူးဝက် ၅၅၀ အီးစီ ရေဖျော်ပိုးသတ်ဆေးရည်သည် နံနက်စောစောနှင့် ညနေခင်းတွင် ဖျန်းပေးရသည်။ မိုးရွာချိန်တွင် မဖျန်းရပါ။ ဆေးစောစော ဖျန်းထားနိုင်ပါက ပိုမိုထိရောက်သည်။



DUET 550 EC

**ဂျူးဝက်**

၅၅၀ အီးစီ

**ထိသေစားသေ အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ပို ပိုးသတ်ဆေးရည်**

Active ingredient:  
**Cypermethrin:** ..... 5% w/v  
**Chlorpyrifos** ..... 50% w/v  
**Inert material:** ..... 45% w/v  
**Total:** ..... 100% w/v  
 (ဆေးအုပ်စု - Synthetic Pyrethroid + Organophosphate)



မြန်မာ့ဗူရို  
 BURONOS  
 သရုပ်ဆွဲသူ  
 ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD  
 75-83, DIMITAR MANOV STR., SOFIA 1408, BULGARIA

1 Litre

အဆိပ်မြစ်မူအဆင့်အတန်း: GHS အုပ်စု(၃)

**ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ**

ဂျူးဝက် ၅၅၀ အီးစီ ရေဖျော်ပိုးသတ်ဆေးရည်သည် သီးနှံများစွာတွင်ကျရောက်သော ဖျက်ပိုးအမျိုးမျိုးတို့အား ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းပေးနိုင်ရန် နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

လိပ်ပြာ ဖလံများကို အဆင့်အမျိုးမျိုး၌ တစ်ကြိမ်တည်းပက်ဖျန်းရုံဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ပိုးများကို ရုတ်တရက်လဲကျစေနိုင်သောအာနိသင်ရှိ နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ဆေးဖြစ်သည်။ အဆိပ်ငွေ့ ပျံ့နှံ့အာနိသင်တွဲဖက်ပါရှိသဖြင့် အတွင်းနေပိုးများကိုလည်းနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

**အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနည်း**

ဆေးဖျန်းရာတွင်ဝတ်ဆင်ရမည့် လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ လက်ရှည်ဖိနပ် အစရှိသည်များ ဝတ်ဆင်ပြီးမှ ဆေးဖျန်းရန်။ ဆေးဖျန်းစဉ် အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။ ဆေးဖျန်းစဉ် ဝတ်ဆင်သည့်အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပြီးမှ ပြန်လည် ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးဖျန်းပြီး ဆေးထိမိသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် သေချာစွာဆေးကြောပါ။

**သို့လှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း**

ဆေးဘူးခွံများကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရ။ မီးမရှို့ရ။ လုံခြုံသောနေရာတွင် မြေမြှုပ်ဖျက်ဆီးပါ။ ဆေးဖျန်းပုံးနှင့် ဆေးဘူးခွံများကို လူအသုံးပြုသည့် ရေတွင်းရေကန်များ၌ မဆေးကြောရပါ။ အစားအသောက်များနှင့်နီးသောနေရာတွင် မထားရ။ မီးမရှို့ရပါ။

**ရှေးဦးသူနာပြုခြင်း**

အရေပြားနှင့် ထိမိပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် သေချာစွာဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်မိပါက ရေသန့်များများဖြင့် (၁၅)မိနစ်ခန့် အထပ်ထပ်ဆေးကြောပါ။ ဆေးမျိုချမိပါက ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဘွန်နိတ် ၅% ဖျော်တိုက်၍ အော့အန်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။ အဆိပ်မိသော လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရသောနေရာသို့ရွှေ့ထားပေးပါ။ ဆေးဘူးခွံနှင့်အတူ ဆရာဝန်နှင့်ပြသ၍ ကုသမှုခံယူပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် F 2019-2134

ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်  
 ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ  
 သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ

