

အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

ဗန် ၂၄ အီးစီ ရေဖျော်ပေါင်းသတ်ဆေးရည်သည် တစ်နှစ်ခံမြက်မျိုးပေါင်းများနှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်းများကို နှိမ်နင်းရာတွင် အောက်ပါဇယားအတိုင်းအသုံးပြုပါက ထိရောက်မှုရှိသောရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

ဆေးအသုံးပြုနည်း

သီးနှံ	ပေါင်းအမျိုးအစား	ပက်ချန်းရမည့်အချိန်	နှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	ရေ(၁၆)လီတာတွင် ရောစပ်ရမည့် နှုန်းထား(စီစီ)
ဂေါ်ဖါ၊ ပန်းမုံလာ	မြက်သီး ဆင်ဗိုမြက်	ပျိုးပင်ပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီ (၁-၂)ရက်	၆၀၀	၁၀၀
ကြက်သွန်		သီးနှံစိုက်ပြီးအပင်မပေါက်မီ	၄၀၀-၆၀၀	၆၀-၁၀၀
နေကြား၊ ပါ၊ မြေပဲ	ဓမ္မာမြီးပုတ်	ပျိုးစေ့ချပြီး အပင်မပေါက်မီ	၄၀၀	၆၇
	သံပုရစ် ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်			
ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်		ပျိုးပင်ပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီ (၁-၂)ရက်	၄၀၀	၆၇

မှတ်ချက်

- ၁၆ လီတာဝင် ဆေးဖျန်းပုံး (၆)ပုံးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။
- ဆေးဖျန်းချိန်တွင် စိုက်ခင်းအတွင်း အစိုဓာတ်လုံလောက်စွာရှိနေရပါမည်။



F E N 2 4 E C



ရှေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး

အစွမ်းရှိပစ္စည်း : **Oxyfluorfen** 240 g/L w/v
 အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း : 760 g/L w/v
 ဆေးအုပ်စု - **Diphenylether**



မြန်မာ့ ဘရူနိုစ် ပရိုက်ဗရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED) အမှတ်(၄၅/၆၁) (မြို့အမှတ်-E)၊ မဟာမိတ္တရီရိလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း

ထုတ်လုပ်သူ ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD 75-83, DIMITAR MANOV STR., SOFIA 1408, BULGARIA



အဆိပ်မြစ်မှုအဆင့်အတန်း GHS အုပ်စု (-)

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်မိနပ်၊ တောင်းဘီရှည်၊ ရုပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ မျက်မှန်၊ ဦးထုပ်နှင့် အကာအကွယ်အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။
- မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
- ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစားအသောက်၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
- ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆင်ပြာနှင့် ဂရုတစိုက် စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မှ မဖျန်းရ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

- အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးခွံကို အဖုံးတင်းကြပ်စွာ ပိတ်၍ သိုလှောင်ပါ။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
- ဆေးဘူးခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရပါ။ ထုခြေဖျက်ဆီး၍ မြေကျင်းနက်နက်တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသောဆေးဘူးများကို မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် မြောင်းများသို့ စွန့်မပစ်ရ။ မီးမရှို့ရပါ။
- လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးစေ့၊ ဓာတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသိုလှောင်ရ။

ရှေးဦးသူနာပြုနည်း

- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေများများနှင့် ဖြေးညင်းညင်သာစွာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ခွတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသောအရေပြားအား ရေ ဆင်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးရှူမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရှိုင်းသောနေရာတွင် ထားပါ။
- ဆေးကို မျိုချမိပါက ရေနှင့်ပလုပ်ကျင်းပါ။ ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အန်အောင်မပြုလုပ်ရ။ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။

ဖြေဆေး - ဖြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာအရ ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် F 2019 - 2133
 ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်
 ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ
 သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ

