

## 代森锰锌

有效成分含量: 7.5%  
 剂型: 水分散粒剂

低毒



生产企业名称: 保加利亚艾格利亚有限公司

杀菌剂



### 产品性能:

代森锰锌是二硫代氨基甲酸酯类保护性杀菌剂。本品具有悬浮率高、性能稳定、附着力强、耐雨水冲刷等特点,故药效更能充分发挥。其主要作用机制是干扰菌体细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,从而阻碍细胞分裂。本品对苹果轮纹病具有显著效果。

### 使用范围和用法:

| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量 (制剂量/亩) | 施用方法 |
|-------|------|-------------|------|
| 葡萄    | 除皮病  | 175-200克/亩  | 喷雾   |
| 柑橘树   | 疮痂病  | 370-470倍液   | 喷雾   |
| 苹果树   | 轮纹病  | 550-1000倍液  | 喷雾   |

### 使用技术要求:

- 1、本品为保护性杀菌剂,于发病前或发病初期施药,施药间隔10-14天。使用足够喷液量,覆盖全株。
- 2、建议与内吸治疗性杀菌剂交替使用。
- 3、大风天或预计一小时内降雨,请勿施药。

### 注意事项:

1. 配药和施药时,应穿防护服,戴口罩以及胶皮手套,以避免污染皮肤和眼睛,施药完毕应及时换洗衣物,洗净手、脸和被污染的皮肤。
2. 施药前,后要彻底清洗喷雾器械,清洗后的废水不应污染河流等水源,未用完的药液应密封后妥善放置。
3. 用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。
4. 本品对水生生物、蜜蜂、家蚕有毒,禁止在河流、池塘等水体中清洗施药器械,桑蚕养殖区附近禁用,蜜蜂采蜜期禁用,水产养殖区、河塘等水体附近禁用。
5. 每季最多使用3次,安全间隔期14天。
6. 应与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用,以延缓抗性产生。
7. 孕妇及哺乳期妇女避免接触。

### 中毒急救措施:

- 中毒症状: 恶心、呕吐、腹泻、腹泻、头痛、头晕、乏力,严重者可导致呼吸和循环功能衰竭加快,血压下降,呼吸抑制等。
- 急救治疗:
1. 皮肤沾附脱去被溅到衣服。立即用大量清水冲洗皮肤,必要时就医。衣服彻底清洗后方可再穿。
  2. 眼睛溅入立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗建议。
  3. 呼吸转移至空气清新处,如呼吸停止应立即进行人工呼吸,立即寻求医疗救治。
  4. 误食: 不要给神志不清者灌喂任何东西,携带标签立即寻求医疗救治。不要引吐,清醒患者漱口后可饮用一杯温水。

### 储存和运输方法:

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

### 其他说明:

生产企业名称: 保加利亚艾格利亚有限公司  
 国内办事机构: 保加利亚艾格利亚有限公司驻石家庄代表处  
 地址: 河北省石家庄市裕华区体育南大街183号盛典商务9层919室 邮编: 050011  
 电话: 0311-89917377 传真: 0311-89917377 网址: www.agria.com

受托分装单位名称: 苏州福寿福科技有限公司  
 受托分装单位农药生产许可证号: 农药生许(苏) 0063  
 地址: 江苏省苏州市吴中区木渎镇  
 电话: 0512-66572713/66262458 传真: 0512-66261664  
 生产日期(批号): 见包装 质量保证期: 2年



杀菌剂