



艾格利亚®

代森锰锌

有效成分含量:80%

剂型:可湿性粉剂



中毒急救:

使用中或使用后如果感觉不适,应立即停止工作,采取急救措施,并携带标签送医院就诊。

- 1.眼睛接触:立即用流动的清水冲洗15分钟,咨询医务人员。
- 2.皮肤接触:立即用肥皂和清水冲洗15分钟,如仍有刺激感,请立即就医。
- 3.吸入:立即移至新鲜空气处,换掉被污染的衣物,并就医。
- 4.若误食、误饮,立即停止服用,并用大量的清水漱口,并立即携带标签送医院对症治疗。

储存和运输:

- 1.贮运时严防潮湿、日晒,不得与粮食、食物、饮料、种子、饲料等同贮同运。应放置于儿童触达不到之处并加锁保存。
- 2.应贮存于阴凉、干燥通风处。避免将药剂贮存在高温或靠近明火处。

其他说明:

生产企业名称:保加利亚艾格利亚有限公司
国内办事机构:保加利亚艾格利亚有限公司驻石家庄代表处
地址:河北省石家庄市裕华区体育南大街183号盛典商务9层919室 邮编:050011
电话:0311-89917373 传真:0311-89917377 网址:www.agria.bg

受托分装单位名称:苏州遍净植保科技有限公司
受托分装单位农药生产许可证号:农药生许(苏)0063
地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇
电话:0512-66572713/66262458 传真:0512-66261664
生产日期(批号):见包装 质量保证期:2年



杀菌剂



农药登记证号:PD375-2002
农药生产许可证号:农药生许(苏)0063
产品标准号:WQ/359 AGRIA BG03-2018

艾格利亚®

产品性能(用途):

代森锰锌为均匀粉末,其有效成分以络合态存在。它是一种保护性杀菌剂,于发病前或发病初期使用效果较佳。广泛应用于防治真菌性病害。

净含量: 1000克

原产地: 保加利亚

使用技术和使用方法:

作物(或范围)	防治对象	制剂用量	使用方法
番茄	早疫病	170-210 克/亩	喷雾
花生	叶斑病	50-75 克/亩	喷雾
马铃薯	晚疫病	150-180 克/亩	喷雾
苹果树	斑点落叶病	800倍液	喷雾
西瓜	炭疽病	180-250 克/亩	喷雾

注: (1) 公顷用制剂量=亩用制剂量×15

(2) 总有效成分浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数

1.防治番茄、花生、马铃薯、西瓜病害,按照推荐剂量,每公顷用水量750-900升,全株均匀喷雾,喷雾量以叶面滴水为止。防治苹果树斑点落叶病,落花后7天开始施药,间隔7-10天施药一次。如干旱无雨可适当延长间隔时间。请于发病前或发病初期开始施药。

2.根据发病情况,作物生长情况、天气因素决定用药次数。

3.本品无内吸性,其使用效果与喷药质量和制剂质量密切相关,施药时应喷雾均匀周到。

4.大风天或预计1小时内有雨,请勿施药。

本品安全间隔期,番茄: 15天,花生: 7天,马铃薯: 3天,西瓜: 21天,苹果树: 10天,每季最多使用3次。

注意事项:

- 1.勿与强碱性农药等物质混用。
- 2.施药时须穿戴防护衣服,避免药液接触皮肤和眼睛。请勿吸烟、饮食、喝水。
- 3.施药后要用水和清水彻底清洗手、脸和其他裸露部位,并及时更换衣物。
- 4.施药后要按照相关规定处理包装物,在洗涤药械和处理废弃物时不要污染池塘、河流和水源。
- 5.本品对鱼类等水生生物有毒,远离水产养殖区、河塘等水体附近施药,禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
- 6.建议与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用,以延缓抗性产生。
- 7.用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。
- 8.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。

生产企业名称: 保加利亚艾格利亚有限公司

杀菌剂