



معلومات عامة: نازا SL36 ميبد أعشاب جهازي غير إنباتني، سريع التثكك في التربة، يستعمل رشاً على الأوراق.  
نازا SL36 فعّال على الأعشاب الضارة الحولية الموسمية والمعمرة ويمكن إستعماله للقضاء على تلك التي تصب  
الكروم طوال  
الموسم. تمسّخ الأعشاب المستهدفة نازا SL36 عن طريق الأوراق والتموّات الخضريّة. وتنتقل المادة الفعّالة بعد  
ساعات عن طريق العصارة إلى الجذور والمناطق القميّة. يقضي نازا SL36 على جميع أجزاء النباتات المستهدفة (فوق وتحت  
التربة). تظهر  
بؤاد الإفصّار على الأعشاب المرشوشة: - بعد 3 إلى 10 أيام (الأعشاب الموسميّة) - بعد 7 إلى 15 يوم (الأعشاب المعمرة)  
الإستعمالات المصدّقة:

| المحصول | الآفة          | نسبة الإستعمال       | ملاحظات                                     |
|---------|----------------|----------------------|---|
| الكروم  | الأعشاب الضارة | 4 إلى 12 لتر / هكتار | عدم الرش في الكروم التي لا تتناهزال 4 سنوات |

- نقادي ملامسة رذاذ المبيد للأجزاء الخضريّة للكروم • يجب المعالجة عندما تكون الأعشاب الضارة تنمو بنشاط
- يجب إستعمال قنات مناسب للرشّ الموجه دون التسيّب بالإجراف • عدم تخطي 3 رشّات للموسم الواحد
- طريقة الرش: • رشّ مستوعب المبيد جيّداً قبل الإستعمال.
- عمّيق خزان الرشّ إلى 4/3 بأناء التنظيف مع البدء بالزّحف. أضف الكميّة المطلوبة من نازا SL36 مع متابعة الخلط.
- يجب متابعة الخلط خلال الرشّ حفاظاً على تجانس محلول الرشّ.
- يجب ألاّ يتعدّى حجم الرشّ 400 لتر/ هكتار.
- قابلية المرح: نازا SL36 يناسب خلطه مع معظم المبيدات المشبية. يجب إجراء تجربة مسفّرة قبل تعميم المعلية.
- تصنيف السميّة بحسب مننظمة الصحة العالميّة: Class III
- الإسعافات الأولى: - عند الإبتلاع: غسل الفم وعدم الحثّ على التقيؤ
- عند ملامسة الجلد: غسل بالماء والصابون، نزع الملابس الملوّثة
- عند ملامسة العينين: غسل بالماء لمدة 15 دقيقة
- في حالة الإستنشاق: نقل المصاب إلى مكان حسن التهوية ومنعش
- في كل الحالات إستشارة طبيب أو الإتصال بمركز معالجة التسمم
- في حالة التسمم، الإتصال بمركز معالجة التسمم
- باب المواد نهج سعيد تواتي- باب المواد الجزائر- هاتف: 021.97.98.98



# NASA® 36 SL

## نازا® SL36

HERBICIDE  
مبيد أعشاب

Herbicide total à action systémique

مبيد أعشاب جهازي عام

MATIERE ACTIVE: 360 g/L Glyphosate acide  
FORMULATION: SL= Concentré soluble  
CHUPPA: No. 13 53 038

المادة الفعّالة غليفوسات أسيد  
التركيب: سائل ذائب  
رقم التسجيل



إحفظ المبيد في وعائه الأصلي بعيداً عن متناول الأطفال

Produit par AGRISA SA, BULGARIE  
Assenovgradsko Shosse Str., 4009 Plovdiv, Bulgarie  
Tel.: +359 32 638 369  
Pays D'origine: Bulgarie

إنتاج: أفرها سراً  
أسيدوفراد شو 4009 بلوفيف، بلغاريا  
هاتف: +359 32638369  
بلد المنشأ: بلغاريا

استيراد وتوزيع:  
ديانة للزراعة - الجزائر ش ذ  
مننظمة للتشاطر رقم 63. الطابق الأول، عين البنيان،  
الجزائر. هاتف: 0213 (23) 10 86 53/55



Importé par:  
Debbané pour l'Agriculture Algérie snc.  
Zone d'activité, N°63, premier étage, Ain Benian,  
Alger - Algérie. Tél : +213 (23) 10 86 53/55

Contenu: 1 Ltr  
Date de production: 1/06/2019  
date d'expiration: 1/06/2021  
N° de lot: 201906

السميّة:  
تاريخ الإنتاج:  
تاريخ إنتهاء الصلاحية:  
رقم المفعلة:

GENERALITES : NASA 36 SL est un herbicide foliaire à action systémique, non sélectif et non rémanent dans le sol. Il est efficace contre les adventices annuelles, bisannuelles et vivaces ; il peut être utilisé pour le désherbage des vignobles pendant toute l'année. Il pénètre dans les plantes ciblées à travers les feuilles et les parties vertes ou bois non aoûtées, touchées par l'application.

NASA 36 SL est transporté rapidement par la sève vers les zones méristématiques et jusqu'à l'extrémité des racines, ce qui lui permet de détruire les parties aériennes et souterraines de la plante visée.

Les symptômes de dépérissement apparaissent :

- 3 à 10 jours après le traitement des plantes annuelles
- 7 à 15 jours après le traitement des plantes vivaces

USAGÉS HOMOLOGUES :

| CULTURE | RAVAGEUR   | DOSE        | REMARQUES                            |
|---------|------------|-------------|--------------------------------------|
| Vigne   | Adventices | 4 - 12 L/ha | Appliquer sur vigne de plus de 4 ans |

- Eviter tout contact avec les feuilles et les tiges non aoûtées de la vigne.
- Traiter durant la période de croissance active des adventices
- Utiliser des buses adaptées.
- Ne pas dépasser 3 applications par an
- PRÉPARATION DE LA BOUILLIE : Bien agiter le bidon / la bouteille du produit. Mettre 2/3 de la quantité d'eau requise dans le réservoir du pulvérisateur. En faisant fonctionner l'agitateur, verser la quantité requise du NASA 36 SL en maintenant une agitation constante puis compléter avec la quantité d'eau nécessaire. Le volume de bouillie ne doit pas dépasser 400 L/ha
- Compatibilité : NASA 36 SL est compatible avec la plupart des herbicides. Effectuer un essai avant de généraliser le traitement.
- Toxicité : est classé III selon l'OMS
- Premiers soins : En cas d'ingestion : rincer la bouche avec de l'eau et en boire beaucoup. N'induirez pas le vomissement.
- contact avec la peau : se laver à fond avec de l'eau et du savon immédiatement. Eliminer les habits et souliers contaminés.
- Contact avec les yeux : rincer sous un mince filet d'eau à débit constant pendant 15 minutes. En cas d'inhalation : déplacer la personne de la zone dangereuse vers un endroit frais et aéré. Dans tous les cas Consulter un médecin ou contacter un centre antipoison et présenter l'emballage du produit.

EN CAS D'INTOXICATION CONTACTER LE CENTRE ANTI-POISON DE BAB EL OUED-Boulevard

Said TOUATI, Bab El Oued, Alger. Tél : 021 97 98 98- Jour et nuit.

Antidote: Pas d'antidote spécifique connu. Traiter symptomatiquement.

Précaution d'emploi : Porter des vêtements de protection pendant l'application (gants, bottes, lunettes).

- Ne pas boire, manger ou fumer durant l'application.
- Ne pas contaminer les points d'eau.
- Ne pas traiter par temps de sécheresse ou de grand froid
- Eviter la dérive vers les cultures voisines
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Ne pas stocker à proximité des denrées alimentaires et aliments pour les animaux.
- Tenir à l'abri du gel.
- Eliminer les emballage vides loin des points d'eau.

Garantie et responsabilité : Le fabricant garantit la qualité du produit à condition qu'il soit remis à l'utilisateur dans son emballage d'origine.

L'utilisateur assume les risques pour les préjudices résultant de facteurs indépendants de la volonté du fabricant.

Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité pour les préjudices dus à un stockage ou à une utilisation du produit non-conforme aux recommandations.

Bien lire l'étiquette avant d'utiliser le produit et respecter toutes les consignes de sécurité.



Caution



حذر