

Masat parambrojtese:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te paarritshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerezit si dhe ushqimeve per blegtorine.
- Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Evitoni kontaktet e syve dhe te lekures me preparatin.
- Evitoni thithjen e avujve te preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkatjes.
- Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Ne perfundim te punes lani paisjet mbrojtese, mjetet sperkatese, duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit.
- Beni shkaterrimin e ambalazhit sipas rregullave ne fuqi.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Ne rast gellitje, marrje me organet e frymamarrjes dhe me lekuren shkakton keto shenja helmimi: dermatit, konjuktivit, vjellje, diare, apati.
- Ne rast demtimi kerkoni ndihme mjekesore ne qendren spitalore me te afert dhe tregojini mjekut etiketen.
- Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi simptomatik.

Ndikimi ne ekosistem: Mesatarisht helmues per gjitarët. Mesatarisht helmues per zogjtë. Pak helmues per bletët. Mesatarisht helmues per peshqit dhe per jovvertebrorët ujorë. Mos ndotni ujrart dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Prodhues: AGRIA S.A.



www.agria.bg



"1 DEMSHEM" - "TRITANT" - "1 DEMSHEM
PER MIEDISIN" (N)
Frazat e rrezikut (R): R36, R51, R53.
Frazat e sigurise (S): S26, S35, S39, S57.



NASA SL

HERBICID TOTAL

me bazë Glifosati

Lenda vepruese: 36 % Glifosate
Formulimi: Koncentrat i tretshem në ujë (SL)



Perdorimi:

NASA SL eshte nje herbicid i pas mbirrjes, me veprim total, duke luftuar si barerat gjethegera ashtu edhe ato gjethegushta ne periudhen e rritjes aktive. Pas marrjes nga gjethet, ai qarkullon me lengjet bimore ne te gjitha pjeset, e vecanerisht ne ato nenetokesore. Nuk le mbetje ne toke, prandaj tokat e trajtuara mund te mbillen pak dite pas trajtimit me te gjitha llojet e kulturave.

Keshtu ai mund te perdoret perpara mbjelljes se perimeve, panxharit, grurit dhe te lashtave te tjera, orizit, livadheve, fidanishteve, farishteve, etj. Trapiantimi i fidanave dhe mbjellja e farerave te behet te pakten 48 ore pas trajtimit.

Perdoret ne luftimin e barerave te keqia ne agrume, farore, berthamore, ullinj, vreshta, trendafilishte, etj. Nuk rekomandohet ne pemtores dhe vreshtat e reja.

Pervec bujqesise ka gjetur perdorim edhe ne luftimin e barerave ne bordura dhe anet e rrugeve, midis shinave hekurudhore dhe mjedisve te tjera, ku prania e barerave eshte shqetesuese.

Doza e perdorimit:

6-12 lit preparat/ha, duke perdorur 400-600 litra uje, ne vartesi te zhvillimit te barerave te keqia.

Kunder barerave te keqia nje vjecare si: *Rumex hyumenosepalus*, *Cyperus spp.*, *Cirsium arvense*, *Sorghum halepense*, me 6 lit preparat/ha.

Kunder barerave mesatarisht rezistente si: *Artemisia spp.*, me 8 lit preparat/ha. Kunder barerave rezistente doza mund te shtohet: per graminoret 10 lit preparat/ha, per *Convolvulus spp.* 12 lit preparat/ha.

Verejtje per perdorimin:

Shmagnit kontaktin e pikave sperkatese me kulturat e tjera bujqesore. Mos sperkatni ne dite me ere.

Mos trajtoni barerat e keqia te cilat vuajne nga strese te ndryshme si thatesia, te ftohtit etj.

Nuk perzihet me produkte te tjera me reaksion alkaline ose acid.

Perdoret ekskluzivisht ne kohen dhe per qellimet e parashikuara ne kete etikete. Cdo perdorim tjeter do te ishte me reziqe.

Perdoruesi mban pergjegjesi per demet qe mund te shkaktohen nga perdorimi ndryshe nga rekomandimet e kesaj etikete.

Fitotoksiciteti: Nuk aplikohet

Karenca: Nuk aplikohet

Magazini: Preparati ruhet ne vende te erreta pa diell dhe pa lageshti, ne temperature -5 deri ne 35 o C.

Numri Regjistrimit: NASA SL 30-994-2017

Data e regjistrimit: 2018

Importues dhe Distributor: NTP JONATAN-P Prizren-Kosovo

1 Liter

Data e prodhimit: Printed on cap
Afati i ruajtjes: 5 vjet