

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ မျက်ကာမုန့်၊ အနားကျယ်သော ဦးထုပ်၊ မျက်နှာဖုံး စသည့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို အပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ရမည်။
- မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
- ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
- ဆေးဖျန်းပြီးပါက ဆေးထိသောနေရာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် သေချာစွာဆေးကြောပါ။
- ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆပ်ပြာနှင့် ဂရုတစိုက်စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မု မဖျန်းရ။
- ငါးနှင့် ပျားများကို အဆိပ်သင့်စေနိုင်သဖြင့် ဂရုပြု၍ အသုံးပြုပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

- အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးကို အဖုံးတင်းကြပ်စွာပိတ်၍ သိုလှောင်ပါ။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
- ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရပါ။ ထုထွက်ချက်ဆီ၏ မြေကျင်းနက်နက်တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသောဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံများကို ဖြစ်ရောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် မြောင်းများသို့ မစွန့်ပစ်ရ။ မဆေးကြောရ။ မီးမရှို့ရပါ။
- လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးဓေ့၊ ဓာတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသုံးလှောင်ရ။

ရှေးဦးသူနာပြုရန်

- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေသန့်များဖျန်းပြီး ဖြေးညှင်းညင်သာစွာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ခွာတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသောအရေပြားအား ရေ၊ ဆပ်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးရှူမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရရှိသောနေရာတွင် ထားပါ။
- ဆေးကို မျိုချမိပါက အန်အောင်မပြုလုပ်ရ။ အညွန့်စာပါသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံနှင့်အတူ နီးစပ်ရာဆရာဝန်ထံ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။

ဖြေဆေး - ဖြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လူကုကာအရ ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် **P2018 - 4234**
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ



PEROZIN 80 WP

ပါရိုဇင်



၈၀ ဒပလျူပီ

မှိုသတ်ဆေး

Active Ingredient :Zineb 80%
Inert Materials : 20 %
ဆေးအုပ်စု - Carbamate



မြန်မာနိုင်ငံ
BURONOS

ဘရူနိုင်း ပရိတ်ဗေ(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED)
အမှတ်(၅၉/၆၁) (မြို့အမှတ်-E)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဗိုလ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း

1 kg



Agria S.A.
Asenovgradsko shose, Plovdiv 4009, Bulgaria
www.agria.bg

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း GHS အုပ်စု(၅)



BURONOS | **ပါရိုဇင် ၈၀ ဒပလျူပီ**
မှိုသတ်ဆေး

ဆေးမသုံးစွဲမီ အညွန့်ကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

ပါရိုဇင် ၈၀ ဒပလျူပီသည် သီးနှံပင်များတွင် ကျရောက်ဖျက်ဆီးတတ်သော မှိုရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော ထိသေအာနိသင်ရှိ မှိုသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုရန်အညွန့်

| သီးနှံ | ကျရောက်သည့် ရောဂါ | နှုန်းထား | | ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်သိမ်းမှုမှတစ်ဆင့် ဖော်ပြနိုင်မည့် ရက် |
|---------------------------------|---|-----------|----------------|--|
| | | ဂရမ်/ဧက | ဂရမ်/ ရေ၂၀လီတာ | |
| ပဲခူး | ရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ အိမ်းနီမှိုရောဂါ | ၂၅၀-၃၀၀ | ၄၀-၅၀ | ၇-၁၅ |
| ခရမ်းချဉ်အာလူး | စောပင်နာကျရောဂါ၊ နောင်ပင်နာကျရောဂါ | ၂၀၀-၃၀၀ | ၃၅-၅၀ | ၇-၁၅ |
| သခွား | အိမ်းနီမှိုရောဂါ | ၂၅၀-၃၅၀ | ၄၀-၆၀ | ၇-၁၅ |
| ငရုတ်ချို၊ ငရုတ်၊ ငရုတ်ပွ | ဖားမျက်စိရောဂါ၊ မှိုပြောက်စွန်းရောဂါ | ၂၀၀-၂၅၀ | ၃၅-၄၀ | ၇-၁၅ |
| ကြက်သွန် | တောက်တိုမြီးရောဂါ၊ အိမ်းနီမှိုရောဂါ | ၃၀၀-၃၅၀ | ၅၀-၆၀ | ၇-၁၅ |
| ပဲမျိုးစုံ | ရွက်ပြောက်ရောဂါ | ၂၅၀-၃၀၀ | ၄၀-၅၀ | ၇-၁၅ |
| ပပျစ် | ဖားညှိရောဂါ၊ အိမ်းနီမှိုရောဂါ | ၃၀၀-၃၅၀ | ၅၀-၆၀ | ၇-၁၅ |

- သီးနှံစိုက်ခင်းတစ်ဧကအတွက် ၂၀ လီတာဝင် ဆေးဖျန်းပုံ (၆)ပုံနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။
- သီးနှံတစ်ရာသီတွင် ဆေးဖျန်းကြိမ်ရေ (၂-၃)ကြိမ်ထက် ပိုမပျန်းပါနှင့်။
- ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၁၀-၁၄)ရက်
- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သော ကာလ - (၂၄)နာရီ
- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် (၆)နာရီခန့်မှီလွတ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။

