

RIVAL DUO 450 SC

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

KLASA: 3



“KUJDES”



I RREZIKSHEM PER MJEDISIN. N.

Frazat e rezikut: (R) R43, R52/53; **Frazat e sigurise: (S)** S2, S23, S24, S29/35, S36/37, S46, S51.

Formulimi: *Koncentrat i Suspendueshem (SC).*

Permbajtja: *Propamocarb hcl. 400 gr/lit + Cymoxanil 50 gr/lit.*

RIVAL DUO 450 SC eshte fungicid me veprim translaminar dhe sistemik, ne saje te permbajtjes se dy lendeve aktive (propamocarb dhe cymoxanil), me efikasitet te spikatur ne luftimin e Oomiceteve te gjinise Pithium, Fitoftora, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara dhe Bremia, shkaktare te vrugjeve dhe kalbezimeve te qafes ne mjaft kultura bujqesore.

Masat parambrojtese:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa ariteshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve
- Evitoni kontaktet e zgjatura te syve dhe lekures dhe marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjate punes.
- Gjate punes mos hani e pini, perdor paisje mbrojtese.
- Ne perfundim te punes, lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit, paisjet mbrojtese, mjetet sperkatese.
- Asgjesimi i ambalazheve te behet sipas rregullave ne fuqi.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat, lahuni me uje te bollshem dhe sapun.
- Ne rast thithje te tretesires sperkatese me organe e frymemarrjes, i aksidentuari cohet ne nje mjedis te ngrohete dhe te ajrosur
- Ne rast helmimi kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore, duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
- Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Perdorimi:

RIVAL DUO 450 SC perdoret per luftimin vrugut ne domate, kungullore, patate, sallate e perime te tjera. Ne saje te kombinimit te efektit te shpejte lokosistemik te cymoxanilit me ate sistemik e preventiv te propamocarbit, behet e mundur te crenjosez infeksioni dhe te sigurohet nje mbrojtje e bimes ne 7-10 dite, ne vartesi te intensitetit te semundjes. Nga ana tjetere, formulimi garanton mos

shplarjen e materialit sperkates nga reshjet 1 ore pas sperkatjes.

Trajtimet kryhen para ose me dallimin e njollave te para te vrugut. Doza e perdorimit eshte 2 lit/ha, duke kryer deri ne 7 trajtime per sezon. Ne trajtime te lokalizuara solucioni sperkates perdoret me preqendrim 0.2-0.25 %.

Verejtje per perdorimin:

Ne fillim perzihet preparati me pak uje dhe kur te jete homogenizuar mire shtohet sasia tjetere e ujit. Normat e perdorimit te ujit levizin 200-2000 lit, sipas kulturave dhe stadeve vegetative.

Nuk perzihet me produkte alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk eshte fitotoksik kur perdoret ne kulturat e mesiperme dhe sipas dozave te rekomanduara.

Ndikimi ne ekosistem:

Eshte i demshem per organizmat ujore. Mos ndotni ujrart dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Koha e pritshmerise (karena):

14 dite.

Magazinimi:

Ruajeni ne ambalazhin origjinal, ne vende te thata e te ajrosura, te shmangura nga rrezet direkte te diellit dhe ne temperatura nen 38°C.

Nr dhe data e regjistrimit: **598, datë 06.07.2015;**

Sasia neto: 200L

Data e prodhimit: **Pril 2019**

Nr i lotit: **20190401**

Periudha e ruajtjes: **3 vjet;**

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: **Zenith CropSciences Bulgaria. Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.**

Emri dhe adresa e Aplikantit: **Zenith CropSciences Bulgaria. Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.**