

အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

စကော်ပီယို ၇.၅ အီးစီသည် စပါးခင်းအတွင်းပေါက်ရောက်သော တစ်နှစ်ခံမြက်များ၊ နှစ်ရှည်ခံမြက် မျိုးပေါင်းများကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းပေးနိုင်သော ထိသေနှင့် ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိသော စပါး ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သော ပေါင်းများ	ဆေးဖျန်းချိန်	စီစီ/ဧက	ခင်လီတာစင် ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ပုံးတွင် ထည့်ရမည့် ဆေးပမာဏ(စီစီ)
တိုက်ရိုက် မျိုးစေ့ချစပါး	မြက်သီး၊ ဒေါင်းမြီးပုံ၊ ဝမ်းဘဲစာမြက်၊ လက်သဲခွမြက်၊ တစ်နှစ်ခံ မြက်များ	ပေါင်းပင် (၂-၆)ရွက် ထွက်ချိန် (သို့မဟုတ်) မျိုးစေ့ချပြီး/ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပြီး (၁၅-၂၅)ရက်	၂၅၀-၃၀၀	၃၀-၅၀
ရွှေ့ပြောင်း စိုက်စပါး				၃၀-၅၀

တစ်ဧကကျင် ဆေးဖျန်းပုံး(၆)ပုံနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။
ဆေးဖျန်းထားသောစိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၂၄)နာရီ

- မှတ်ချက်**
- ဆေးဖျန်းခင် (၁)ရက်ခန့်ကြိုတင်၍ ရေထုတ်ပေးထားရမည်။
 - ဆေးဖျန်းပြီးနောက် နေ့ဝက်အကြာတွင် ရေပြန်သွင်းပေးရမည်။
 - ရေအနက်(၁.၅-၂)လက်မတွင် (၅-၆)ရက်ထိ ရေထိန်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
 - ဆေးဖျန်းပြီး(၃-၅)ရက်ကြာတွင် စပါးဝါသွားတတ်သည်။ (၅-၇)ရက်ကြာတွင် ပြန်ကောင်းလာတတ်သည်။



SCORPIO 7.5 EC

စကော်ပီယို

၇.၅ အီးစီ

စပါးခင်းရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး

အစွမ်းရှိပစ္စည်း : Fenoxaprop-p-ethyl 7.5% EC

အစွမ်းပဲ့ပစ္စည်း : 92.5%

ဆေးအုပ်စု - Aryloxyphenoxy-propionate



မြန်မာ



ဘရူနို ဗရိုက်ဇေ့(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED)
အမှတ်(၅၅/၆၁)၊ (မြန်မာတိုင်း-၆)၊ မဟာမိတ္တူရိယာလမ်း၊ ဗဟန်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း

ထုတ်လုပ်သူ



ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
75-83, DIMITAR MANOV STR, SOFIA 1408, BULGARIA

1000 cc

အဆိပ်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်: GHS အုပ်စု (-)

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ရှပ်အင်္ကျီ လက်ရှည်၊ မျက်မှန်၊ ဦးထုပ်နှင့် အကာအကွယ်အဖြစ်အစုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။
- မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
- ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
- ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆပ်ပြာနှင့် ဂရုတစိုက် စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မှ မဖျန်းရ။

သို့လှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

- အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးခွံကို အဖုံးတင်းကြပ်စွာပိတ်၍ သို့လှောင်ပါ။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။
- ဆေးဘူးခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရပါ။ ထုခြေဖျက်ဆီး၍ မြေကျင်းနက်နက် တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများကို မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် မြောင်းများသို့ စွန့်မပစ်ရ။ မီးမရှို့ရပါ။
- လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးစေ့ ဓာတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသို့လှောင်ရ။

ရှေးဦးသူနာပြုခြင်း

- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေများများနှင့် ဖြေးညင်း ညင်သာစွာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့်ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသော အရေပြားအား ရေ၊ ဆပ်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
- ဆေးရှူမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရရှိသောနေရာတွင် ထားပါ။
- ဆေးကို မျိုချမိပါက ရေနှင့် ပလုပ်ကျင်းပါ။ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အန်အောင် မပြုလုပ်ရ။ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။

ဖြေဆေး - ဖြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လွတ်စေရန်အတွက် ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် **F 2019-2135**

ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ

