

SOLUTION PRO

Lënda vepruese:

39.75 % Oksiklorur bakri+4.2 % Cymoxanil

Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

SOLUTION PRO është fungicid me veprim sistematik lokal si dhe kontakti, i cili përdoret në kontrollin e vrugut në hardhi, patate, domate, trangull e perime të tjera. Cymoxanili ka veprim sistemi të lokalizuar dhe të shpejtë, duke penguar mbirjen e sporeve; ndërsa Oksiklorur bakrit ka veprim kontakti dhe të zgjatur.

Klasa 2, Xn
DEMSHEM, IRRITUES



N - I DEMSHEM PËR
MJEDISIN



Frazat e rezikut: R20/22; R43, R50, R53.
Frazat e sigurisë: S2, S36/37, S46, S60, S61.

40 x 250gr

Përdorimi:

Ne vreshta, për kontrollin e vrugut, duke trajtuar heret, me 250-300 gr/100 lit ujë.
Ne patate, për kontrollin e vrugut, me 2.5-3 kg/ha.
Ne perime, për kontrollin e vrugjeve, me 2.5-3 kg/ha, me volum tretesire 400-600 lit. ujë.

Masat mbrojtëse:

- Mbajeni në vende të sigurta dhe të paarrtshme nga fëmijet.
- Ruajeni në vende të thata dhe të fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve për njerëzit si dhe ushqimeve për blegtorinë.
- Evitoni kontaktet e zgjatura të syve dhe lekures me preparatit.
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkatës dhe gjatë spërkatjes.
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe duhan.
- Gjatë punës përdor pajisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Në perfundim të punës lani pajisjet mbrojtëse dhe mjeket spërkatëse.
- Pas perfundimit të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit.
- Asgjësimi i ambalazheve të behet sipas rregullave në fuqi.

Udhëzime për ndihmen e parë dhe keshilla për mjekun

- Në rast kontakti me lekuren ose mukozat lahuni me ujë të bollshëm dhe sapun.
- Në rast thithje të tretesirës spërkatëse me organe e frymemarrjes, i aksidentuari cohë në një mjedis të ngrohtë dhe të ajrosur.
- Në rast helmimi kerkoni menjëherë ndihmë në qendren më të afert spitalore, duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti.
- Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Varejtje për përdorimin:

- Përzihet me produktet e tjera, me përjashtim të atyre me reaksion alkalik.
- Nuk duhet të përdoret në kultura që kanë kaluar strese nga temperaturat e uleta, uijtja e tepert, thatësira, etj.
- Nuk përdoret në bimët zbukuruese.

Ndikimi në ekosistem:

- Nuk është helmues ndaj bleteve.
- Është helmues ndaj peshqve dhe organizmave të tjera ujore, prandaj mos ndotni ujrën me këto produkt ose me ambalazhet e tij.

Magazini:

- Preparati ruhet në vende të errëta dhe pa lagështi, në temperatura 0-35o C.

Fitotoksiciteti:

- Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

Karenca: 21 dite tek rrushi dhe qeporet; 7 dite në domate dhe patate; 5 dite tek kungulloret.

Antidot specifik nuk njihet, mjekimi simptomologjik.

Fitotoksiciteti: Nuk është fitotoksik në dozat dhe kulturat e rekomanduara.
Përzihet me shumicën e fungicideve dhe insekticideve përveç atyre me reaksion alkalik.
HELMUES PËR PESHQIT DHE ORGANIZMAT UJORE.

Numri dhe data e regjistrimit: 464; 23.7.2012.

Data e prodhimit: 04.2014

Afati i ruajtjes: 34

Z Prodhues:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

AGR
SHEGAJ

Importues: Shegaj AGR sh.p.k.

SOLUTION PRO

Lënda vepruese:

39.75 % Oksiklorur bakri+4.2 % Cymoxanil

Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

SOLUTION PRO është fungicid me veprim sistematik lokal si dhe kontakti, i cili perdoret ne kontrollin e vrugut ne hardhi, patate, domate, trangull e perime te tjera. Cymoxanili ka veprim sistemi te lokalizuar dhe te shpejte, duke penguar mbirjen e sporeve; ndersa Oksiklorur bakrit ka veprim kontakti dhe te zgjatur.

Klasa 2, Xn
DEMSHEM, IRRITUES



N - I DEMSHEM PËR
MJEDISIN



Frazat e rezikut: R20/22; R43, R50, R53.
Frazat e sigurisë: S2, S36/37, S46, S60, S61.

20 x 500gr

Përdorimi:

*Ne vreshta, per kontrollin e vrugut, duke trajtuar heret, me 250-300 gr/100 lit uje.
Ne patate, per kontrollin e vrugut, me 2.5-3 kg/ha.
Ne perime, per kontrollin e vrugjeve, me 2.5-3 kg/ha, me volum tretesire 400-600 lit. uje.*

Masat mbrojtese:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te paarrtshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerезit si dhe ushqimeve per blegtorine.
- Evitoni kontaktet e zgjatura te syve dhe lekures me preparatin.
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkatjes.
- Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Ne perfundim te punes lani paisjet mbrojtese dhe mjetet sperkatese.
- Pas perfundimit te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit.
- Asgjesimi i ambalazheve te behet sipas rregullave ne fuqi.

Udhезime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun

- Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat lahuni me uje te bollshem dhe sapun.
- Ne rast thithje te tretesires sperkatese me organe e frymemarrjes, i aksidentuari cohet ne nje mjedis te ngrohte dhe te ajrosur.
- Ne rast helmimi kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore, duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
- Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Verejtje per perdorimin:

- Perzihet me produktet e tjera, me perjashtim te atyre me reaksion alkaline.
- Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar strese nga temperaturat e uleta, uijtja e tepert, thatesia, etj.
- Nuk perdoret ne bimet zbkuruese.

Ndikimi ne ekosistem:

- Nuk eshte helmues ndaj bleteve.
- Eshte helmues ndaj peshqve dhe organizmave te tjere ujore, prandaj mos notditi ujrat me kete produkt ose me ambalazhet e tij.

Magazinimi:

- Preparati ruhet ne vende te erreta dhe pa lageshti, ne temperature 0-35o C.

Fitotoksiciteti:

- Nuk eshte fitotoksik kur perdoret me dozat dhe ne kulturat e rekomanduara.

Karenca: 21 dite tek rrushi dhe qeporet; 7 dite ne domate dhe patate; 5 dite tek kungullorete.

Antidoti specifik nuk njihet, mjekimi simptomologjik.

Fitotoksiciteti: Nuk eshte fitotoksik ne dozat dhe kulturat e rekomanduara.
Perzihet me shumicen e fungicideve dhe insekticideve pervec atyre me reaksion alkaline.
HELMUES PER PESHQIT DHE ORGANIZMAT UJORE.

Numri dhe data e regjistrimit: 464; 23.7.2012.

Data e prodhimit: 04.2014

Afati i ruajtjes: 35

Z Prodhuues:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

AGR
SHEGAJ

Importues: Shegaj AGR sh.p.k.