



T  
HELMUES



"I rrezikshem  
per mjedisin". N.

# TERRAGUARD PLUS EC

**Lenda vepruese: 480 gr/lit Chlorpyriphos + 50 gr/lit Cypermethrin**  
**Tipi i formulimit: Koncentrat i Emulsionueshem (EC)**

Eshte insekticid me perbërje fosforanike dhe piretroide, me spekter te gjere. Karakterizohet nga veprimi i fuqishem kontakti dhe frymëmarrje. Si rezultat i permajtjes se dy lendeve vepruese me mekanizem te ndryshem veprimi (Chlorpyriphos dhe Cypermethrin), shfaqet me nje spekter te gjere veprimi, duke kontrolluar me sukses insekte te grupave te ndryshme dhe me menyra te ndryshme jetese.

**Perdorimi:** *Ne pemë frutore* per kontrollin e breshkezave te ndryshme, mizes mesdhetare dhe diptereve te tjera, tripseve, morrit te pergiakshem, krimbit te molles, dardhes dhe kumbulles, grezrezave, minusezeve te gjitheve, me 0.05-0.07 %, ose 50-70 ml preparat/100 L ujë. **Ne ullinj dhe agrume** per kontrollin e breshkezave pambukore dhe breshkezave te tjera si *Prays citri*, *Ceroplastes siensis*, *Aonidiella aurantii*, *Planococcus citri*, *Lepidosaphes glomeris*, krahebardhave (*Trialeurodes*, *Bemisia*), me 0.05-0.07 %, ose 50-70 ml preparat/100 L ujë. **Ne vreshta** per kontrollin e tenjave te rrushit, breshkezave, filloxeres, hundegjati, *Pulvinaria vitis*, me 0.05-0.075 %, ose 50-75 ml preparat/100 L ujë. **Ne perime** per kontrollin e krahebardhave, minusezeve te gjitheve, krimbane te murrime, krimbane te lakres, trispit, diptereve (miza e gipes, lakrares, karrotas), etj., me 0.075-0.1 %, ose 75-100 ml preparat/100 L ujë. **Ne patate** per kontrollin e bubreccit (*L. decemlineata*), tenjes se patates ne fushe gjate magazinimit, me 0.05 %, ose 50 ml preparat/100 L ujë. **Ne duhan** per kontrollin e trispit (*Thrips tabaci*), krahebardhes (*T. Vaporariorum*), me 0.05-0.07 %, ose 50-70 ml preparat/100 L ujë. **Ne drithera** per kontrollin e cimkave, lemes, zabrusit, mizes hesen, me 0.05-0.07 %. **Ne miser** per kontrollin e krimbane, me 0.07 %, ose 70 ml preparat/100 L ujë. **Ne jonshe e foragjere te tjera** per kontrollin e hundegjatit te jonxhes dhe afideve, krimbane te murrime (*Agrotis spp.*), krimbane te lakres (*Pieris sp.*, *Baratra sp.*), me 0.05-0.07 %, ose 50-70 ml preparat/100L ujë. **Per kontrollin e karkalakeve:** me 0.075 %, ose 75 ml preparat/100 L ujë.

#### Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Shkaktori helmim akut ne rast gjelltitje, marrje me organet e frysma marrjes dhe me lekuren.
- Shenjat e helmimit jane: lotim, vjellje, dhimbje barku, diare, spazme bronkiale, hipotension, dridhje muskulare, konvulsioni, edema pulmonare.
- Ne rast marrje nga goja, te helmuriat i behet lavazh i stomakut. Te mos perdoret qumesht dhe yndyrma.
- Ne rast marrje nga lekura, behet shpearje e lekureve me sapun dhe solucion ujor te bikarbonatit te natriutit.
- Ne rast helmimi, i akidentuar doergohet ne qendren spitalore me te afert, Duke i treguar mjekut etiketten e produktit.
- Te aksidentuarit i behen injeksione endovenozne me atropine çdo 10 minuta deri sa te duken shenjat e atropinizimit. Ky mjekim mund te vazhdoje 24-48 ore.
- Kunder helmimit te mos perdoret morfine, teofiline, aminofiline, coramine.

**Frazat e rrezikut:** H301, H331, H315, H319, H400, H410

**Frazat parandaluese:** P264, P273

**Regjistrimi:** 523; date 02.03.2013;

Data e prodhimit: Dhjetor 2016  
 Afati i rrujtjes: 3 vjet

Prodhues: ZENITH CROPSCIENCES BULGARIA Ltd.

500 ml

**Verejtje per perdorimin:** Trajitet fillojne me shfaqjen e infeksioneve te para. Mos sperkatin si dite me ere. Perzihet me te gjitha fungicidet, me perjashtim te atyre me reaksion alkin si bordolezi, polisulfuri. Mos kryeni me shume se dy trajtime per sezoni.

**Ndikimi ne ekosistem:** Eshte helmues per bletet, prandaj evitonit trajtimet ne lulezim ne pemet frutore ose mermi masa qe ate te mos frekuentoohen nga bletet te pakten nje jave pas trajimit. Eshte shume helmues per peshqit. Mos ndotni basenet, pellgjet dhe rrugjet e ujut me produktin ose ambalazhin bosh. Helmues per insekte e dobishme, kafshet shtepiake, dhe kafshet e egra.

**Karenca:** Ne ullinj, agrume, foragjere, grure e miser 15 dite; perime 21 dite; rrush dhe pemë frutore 30 dite. **Magazinimi:** Mbaht ne vende pa lageshi, ne mungese te ndricimt direkt, ne temperaturat 0-35°C.