

# TOP PLUS 70 WP

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

"KLASA 2". Xn.



"I DEMSHEM"



N- I DEMSHEM PER MJEDISIN

Frazat e rrezikut: R20, R43, R50, R53, R68. Frazat e sigurisw: S2, S36/37, S46, S60, S61.

TOP PLUS 70 WP eshte fungicid sistemik me veprim kurativ dhe parambrojtes me spekter te gjere veprimi per luftimin e semundjeve te ndryshme kequrdhore ne kulturat bujqesore. Merrret si nga pjeset e gjelbera ashtu edhe nga sistemi rrenjor duke qarkulluar ne te gjithe bimen.

Permbajtja: Thiophanate methyl 70%

Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

## Masat parambrojtese:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te paaritshme nga femijet;
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerzit si dhe ushqimeve per blegtorine;
- Evitoni kontaktet e zgjatura te syve dhe lekures me preparatin;
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkatjes;
- Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan;
- Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze;
- Ne perfundim te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit si dhe paisjet mbrojtese, mjetet sperkatese;
- Asgjesimi i ambalazheve te behet sipas rregullave ne fuqi.

## Udhzime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Lani pjeset e kontaminimeve te lekures dhe membranat mukoze menjehere me uje te bollshem e sapun.
- Ne rast se eshte gelltitur preparati, provokoni te vjella.
- Mos i jepni te demtuarit substanca absorbuese si qumesht, vaj, alkool, etj. Jepni te demtuarit qymyr aktiv.
- Nxirreni te demtuarin ne ajer te paster, ne rast te fikti vendoseni ate ne nje pozicion anesor duke i dhene kokes pas, beni frymemarrje artificiale ne se nuk merr fryme.
- Ne rast helmimi, kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.

## Perdorimi:

**Ne domate, spec, patllixhan, tragull, etj.**, per kontrollin e hireve (*Erysiphe spp.*), fuzariozave (*Fusarium spp.*), kalbezimit gri (*Botrytis cinerea*), verticiliozes (*Verticillium spp.*), kalbezimit te bardhe (*Sclerotinia spp.*), njollosjes se gjetheve (*Cladosporium spp.*) dhe antraknozave, me 100 gr/100 lit uje. Trajtimet fillojne me shfaqjen e simptomave te para.

**Ne Shalqin**, kunder fusariozes ne farishte, me 85 gr/100 lit uje, duke perdorur 3-4 litra/m<sup>2</sup> solucion. Kunder fuzariozes ne fusha, me 85 gr/100 lit uje, duke trajtuar bimet individualisht me 200-300 gr solucion per rrenje, duke e persertur 3-4 here gjate vegetacionit..

**Ne sallate laker e lulelaker**, perdoret per kontrollin e fusariozes, hirit dhe kalbezimeve, me 80 gr/100 lit uje, me shfaqjen e simptomave te para.

**Ne fasule dhe bizele**, per kontrollin e hirit (*Erysiphe polygoni*), sclerotinias (*Sclerotinia spp.*), verticiliozes (*Verticillium spp.*) dhe

antraknozës (*Colletotrichum spp.*), me 80 gr/100 lit uje, me shfaqjen e simptomave te para.

**Ne pemet frutore berthamore**, per kontrollin e kalbezimit (*Sclerotinia laxa*), duke perdorur 75 gr preparat/100 lit uje. Trajtimi i pare behet kur kane rene 75 % te petaleve. Per luftimin e hirit me 70gr/100 lit uje.

**Ne molle e dardhe**, per kontrollin e kromave (*Venturia spp.*), me 70 gr/100 lit uje, nga fillimi i çeljes se sythave vegetative. Per luftimin e *Septoria spp.*, me 70 gr/100 lit uje, me çeljen e sythave lulore. Per kontrollin e hirit (*Podosphaera leucotricha*) perdoren 100 gr/100 lit uje, nga fillimi i çeljes se sythave vegetative deri ne rritjen e plote te lastareve, çdo 10-14 dite.

**Ne hardhi**, kunder kalbezimit gri (*Botrytis cinerea*), me 100 gr/100 lit uje, duke filluar nga lulezimi i plote deri 3-4 jave para vjeljes se prodhimit. Per kontrollin e hirit (*Uncinula necator*) perdoret me 100 gr/100 lit uje. Trajtimet fillojne qe nga dalja e 2-3 gjetheve, dhe perseriten ne vartesi te ecurise se infeksionit.

**Ne agrume**, kunder kalbezimit, antraknozës (*Colletotrichum gloeosporoides*), me 100 gr/100 lit uje.

**Ne bime zburkuese**, kunder vrugjeve dhe semundjeve te tjera te gjetheve, hirit, kalbezimit te qafes e te rrenjeve, me 100-200 gr/100 lit uje.

**Per trajtimin e frutave pas vjeljes:** Frutat pas vjeljes zhyten per 1-5 min. ne solucion 0.05-0.1 %.

## Verejtje per perdorimin:

Perzihet me shumicen e fungicideve, insekticideve, akaricideve, rregullatoret e rritjes dhe ushqimeve gjethore. Nuk perzihet me lengun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline. Mos kryej me shume se dy trajtime gjethore per sezon.

## Fitotoxiciteti:

Nuk eshte fitotoksik kur perdoret me dozat dhe ne kulturat e rekomanduara.

## Karenca

Rrush per vere 35 dite. Kulturat e tjera 14 dite.

## Ndikimi ne ekosistem:

Helmues per bletet. Njoftoni bletertesit para se te kryen trajtimet. Helmues per peshqit. Mos ndotni ujrart dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

## Magazinimi:

Ruhet ne vende te errta, te fresketa dhe ne ambalazh origjinal.

Nr dhe data e regjistrimit: **599, datë 06.07.2015;**

Sasia neto: **25kg**

Data e prodhimit: **Janar 2018**

Periudha e ruajtjes: **3 vjet;**

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: **Zenith CropSciences Bulgaria. Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.**

Emri dhe adresa e Aplikantit: **Zenith CropSciences Bulgaria. Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.**