

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni ne vende te sigurta, larg femijeve, pijeve si dhe ushqimeve per njerez dhe kafshe.
- Evitoni kontaktet me syte dhe lekuren
- Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi lengje dhe duhan.
- Gjate punes perdor pajise mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Lani duart dhe pjeset e pa mbuluara te trupit perpara se te hani e te pini.
- Pas perfundimit te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit me uje dhe sapun, si dhe pajisjet mbrojtëse.

Udhëzime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Ne rast kontakti me syte, i lani menjehere me uje te bolleshem dhe sapun per 15 minuta.
- Kerkoni ndihmen mjekesore ne qendren shendetesore me te afert, duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
- Nuk njihet antidot specifik.Mjekimi simptomatik.

Fitotoksiciteti:

Eshte fitotoksik per te lashtat.

Karenca: 1 jave para vjeljes per agrumet; 6 jave per luledielliin; 10 jave per pambukun; 1 muaj per pemet frutore, ullinjtë dhe vreshtat; 8 jave per pataten, panxharin, duhanin, fasulen, sojen.

Perzierja: Per luftimin e njekohshem edhe te barerave te keqia gjthegjera mund te perzihet me herbicide te tjera.

Ndikimi ne ekosistem: Relativisht jo helmues per bletet. Helmues per peshqit. I rrezikeshem per insektet e dobishme. I demshem per kafshet bujqesore dhe shtepiake. Mbani kafshet larg zones se sperkatut per pakten per 60 dite. Mos ndotni ujin e pijshem ose ujin e perdoreshem per ujitje. Ne qoftese ndoten ujrart per ujitje, ato nuk duhet te perdoren pa kaluar dy muaj.

Magazinimi: Magazinohet ne vende te ajrosura, te fresketa dhe pa lageshtire, ne tempereature 0-40°C.

Nr. dhe data e regjistrimit: 40-3380-2012 / 24.12.2012

Nr i lotit: 38

Data e prodhimit : 03 2019

Afati i ruajtjes : 2 vjet

TORNADO 5 EC

500 ml

Tornado 5 EC eshte herbicid selektiv sistemik, i pas mbirjes. Thithet nga gjethet e b. këqia të sapo mbira. Vepron ngadalë: nevojiten 7-15 ditë, në vartësi të stinës, për të dhënë efektin herbicid. Lënda vepruese: 5 % Quizalofop-P-ethyl; Koncentrat i emulsioneshem (EC)

Perdorimi: Përdoret në perime (qepë, karrotë, lule lakër, spinaq, presh, fasule, pjepër, bizele, domate, kungull), lule shtrydhe, bimë industriale (panxhar sheqeri, kolzë, luledielli, sojë, duhan), patate, jonxhë, soje, për kontrollin e b. këqia graminore: - një vjeçare: Alopecurus myosuroides, Lolium spp., Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Digitaria sanguinalis, Avena spp., Phalaris spp.; - shumë vjeçare: Agropyron repens = Elimus repens, Cynodon dactylon, Sorghum halepense. Përdoret me 1-2 lit preparat/ha, në 300-400 lit ujë. Për kontrollin e Sorghum halepense (me rizoma), mund të ndërhyhet me: Trajtim në dy faza, 1 lit preparat/ha, kur b. këqia janë në fazën e ritjes.

Verejtje per perdorimin: Kur mbirja e barerave te keqia zgjat per shum kohe, eshte me mire te behen dy sperkatje (duke perdorur ne seicilen prej tyre 1/2 e dozës se rekomanduar ne intervale nje mujore). Mos mbillni te lashta ose miser ne parcelat e trajtuara pa kaluar te pakten dy muaj nga sperkatja. Nuk rekomandohet perdorimi i ketij produkti ne toka shume ranore. Mos sperkatni ne dite me ere. Sperkatni me presion me te ulet se 3 atm dhe perdorni sprucatore te tipit fshese.

Zbërthehet shpejt në tokë nga mikroorganizmat. Kushtet klimatike të favorshme për ritjen e b. këqia (ngrohtësia dhe lagështia e mirë e tokës) përmirësojnë dhe rrisin efektin e herbicidit. Tek b. këqia graminore shumë vjeçare, copëtimi i rizomave me mjetet e punës ose ato mekanike, përmirëson efektivitetin e herbicidit.



Frazat e sigurise:

H331, H315, H319,

H400 Frazat paralajmeruese: P261, P280, P273, Reagimi: P304 + P340, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391 Magazinimi: P403 + P233 Eliminimi: P501, EUH 401

Prodhuës: Zenith Crop Sciences, Bulgaria LTD

Importues dhe Distributor : NTP JONATAN-P Prizren-Kosovo

