

Masat parambrojtëse:

- Mbajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve, pijeve si dhe ushqimeve për njerëz dhe kafshë.
- Evitoni kontaktet me sytë dhe lekuren
- Gjate përdorimit të tij mos ha e mos pë lëngje dhe duhan.
- Gjate punës përdor pajisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Lani duart dhe pjesët e pa mbuluara të trupit përpara se të hani e të pini.
- Pas përfundimit të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit me ujë dhe sapun, si dhe pajisjet mbrojtëse.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe keshilla për mjekun:

- Në rast kontakti me sytë, i lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe sapun për 15 minuta.
- Kerkoni ndihmën mjekësore në qendrën shëndetësore me të afert, duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti.
- Nuk njihet antidoti specifik. Mjekimi simptomatik.

Fitotoksiciteti:

 Eshtë fitotoksik për të lashtat.

Karenca: 1 javë para vjeljes për agrumet; 6 javë për luledielli; 10 javë për pambukun; 1 muaj për pemët frutore, ullinjtë dhe vreshtat; 8 javë për patatën, panxharin, duhanin, fasulen, sojen.

Perzierja: Për luftimin e njëkohshëm edhe të barerave të keqja gjethëgjera mund të perzihet me herbicide të tjera.

Ndikimi në ekosistem: Relativisht jo helmues për bletët. Helmues për peshqit. I rrezikshëm për insektet e dobishme. I demshëm për kafshët bujqësore dhe shtëpiake. Mbani kafshët larg zonës së sperkatut për pakten për 60 ditë. Mos ndotni ujin e pijshëm ose ujin e perdoreshëm për ujitje. Në qoftëse ndotën ujrat për ujitje, ato nuk duhet të përdoren pa kaluar dy muaj.

Magazini: Magazinohet në vende të ajrosura, të fresketa dhe pa lagështirë, në temperaturë 0-40°C.

Nr. dhe data e regjistrimit: 443; 16.03.2012

Data e prodhimit: Dhjetor 2016

Afati i përdorimit: 3 vjet;

TORNADO 5 EC

500 ml

Tornado 5 EC është herbicid selektiv sistemik, i pas mbirjes. Thithet nga gjethet e b. këqia të sapo mbira. Vepron ngadalë: nevojiten 7-15 ditë, në vartësi të stinës, për të dhënë efektin herbicid. Lënda vepruese: 5 % Quiazlofop-P-ethyl; Koncentrat i emulsioneshem (EC)

Përdorimi: Përdoret në perime (qepë, karrotë, lule lakër, spinaq, presh, fasule, pjepër, bizele, domate, kungull), lule shtrydhe, bimë industriale (panxhar sheqeri, kolzë, luledielli, sojë, duhan), patate, jonxhë, sojë, për kontrollin e b. këqia graminore: - një vjeçare: Alopecurus myosuroides, Lolium spp., Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Digitaria sanguinalis, Avena spp., Phalaris spp.; - shumë vjeçare: Agropyron repens = Elimus repens, Cynodon dactylon, Sorghum halepense. Përdoret me 1-2 lit preparat/ha, në 300-400 lit ujë. Për kontrollin e Sorghum halepense (me rizoma), mund të ndërhyhet me: Trajtim në dy faza, 1 lit preparat/ha, kur b. këqia janë në fazën e ritjes.

Verejtje për përdorimin: Kur mbirja e barerave të keqja zgjat për shumë kohë, është me mirë të behen dy sperkatje (duke përdorur në secilën prej tyre ½ e dozës së rekomanduar në intervale një muaj). Mos mbillni të lashta ose miser në parcelat e trajtuara pa kaluar të pakten dy muaj nga sperkatja. Nuk rekomandohet përdorimi i këtij produkti në toka shumë ranore. Mos sperkatni në ditë me erë. Sperkatni me presion me të ulet se 3 atm dhe përdorni sprucatore të tipit fshese.

Zbërthehet shpejt në tokë nga mikroorganizmat. Kushtet klimatike të favorshme për ritjen e b. këqia (ngrohtësia dhe lagështia e mirë e tokës) përmirësojnë dhe rrisin efektin e herbicidit. Tek b. këqia graminore shumë vjeçare, copëtimi i rizomave me mjetet e punës ose ato mekanike, përmirëson efektivitetin e herbicidit.



Frazat e sigurisë: H331, H315, H319, H400

Frazat paralajmëruese:

P261, P280, P273, P304 + P340, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391, P403 + P233, P501

Prodhues: Zenith Crop Sciences, Bulgaria LTD
Importues: Shegaj AGR sh.p.k.