

TRIOMAX 45 WP

Lënda vepruese:

4 % Cymoxanil, 12 % Mancozeb, 29 % Oksidklorur bakri

Formulimi : Pluhur i lagshem (WP)

TRIOMAX 45 Wp eshte fungicid i kombinuar me veprim kontakti (parandalues) dhe mbrojtues. Eshte sistemik lokal dhe sherues. Perdoret per konmtrollin e vrugeve ne domate, patate, kungulllore, vresht, etj.

Klasa 3, XI
I DEMSHEM, IRRITUES



N - I DEMSHEM PER MJEDISIN



Frazat e rezikut: R37, R43, R50/53.
Frazat e sigurise: S2, S36/37, S46, S61.

40 x 250gr

Perdormi: Eshte fungicid sistemi dhe kontakti, me veprim te difisante, duke frenuar zhvillimin e micelit te kerpuades (*cymoxanil*) dhe frenues per mbrijen e sporeve te kerpuave (*mancozebi* dhe *oxychloruri i bakri*). Perdoret ne trajtimet preventive dhe ne ato kurative. Pas trajtimit, cymoxanili deperon ne indet bimori brenda 6 oreve dhe, ne saje, te levizjes citotropike e translaminare merrjet nga miceli i kerpuades duke penguar zhvillimin e micelit, ndersa mancozebi iha oxychlorurit Cu kane veprim te zgjatur dhe te late biologik si dhe, ne saje te permbytja se manganit dhes zingut ne mancozeb, ka veprim te larte stimulues mbi masen vegetative.

Ne hardhi: Kunder vruget (*Phytophthora viticola*). Trajtimet fillojnë kur çfaqet reziku i infeksionit nga vruget, pra kur lastarte kane arritur gjatëse 10 cm dhe kur kemi reshje dhe lageshit te mijafustueshme ne gjetha. Trajtimet ne fazat e para Jane gjithashtu te efektueshme edhe kundër nekrozes. Doza e perdormit eshte 250-300 gr/100 lit uje. Ne varsete te infeksionit trajtimet mund te perserten cdo 7-10 dite.

Ne perime: Kunder vruget te domates dhe te specit (*Phytophthora spp*), me 250-300 gr/100 lit uje.

Ne patate: Kunder vruget (*Phytophthora infestans*), me 250-300 gr/100 lit uje.

Ne bimet zbulkuar: Per lutrimin e vrugete te ndryshme, me 250-300 gr/100 lit uje.

Mund te aplikohen deri 4 trajtime/sezon, me interval 7-14 dite. Perdoret para sfajeces se infeksioneve ose menjehere pas sfajeces se tyre. Veprimi sherus ndodh nese trajtimi kryhet 24-48 ore pas infeksionit dhe zgjat 6-7 dite. Veprimi parandalues zgjat 14 dite. Perdoret 400-800 lit solucionave.

Karenca: 7 dite per sojen, pataten dhe domaten; 5 dite per kungulloret; 10-14 dite per vreshtin; 15 dite per perimet e tjera.

Masat mbrojtuese:

- Mbajeni ne vende te sigura dhe te pa arriteshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te theata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerezit dhe ushqimeve per blegtorene.
- Evitoni kontaktet zgjatura se syve dhe lekureve me preparatin.
- Evitoni marjin e preparatit me organet e frysmares gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkates.
- Gjate perdorimit mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Gjate punes perdon paisje mbrojtuese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Ne perfundimi te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit si dhe paisjet mbrojtese dhe mjetet sperkatese.
- Asgjesimi i ambalazhevte behet sipas rregullave ne fugi.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun

- Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat, lahuuni me uje te bolleshem dhe sapun.
- Ne rast thithje te tretiesres sperkatese me organet e frysmares, i aksidentuar cohet ne nje mjesid te ngronte dhe te ajrosur.
- Ne rast helmimi, kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore, duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
- Nuk nijhet antidot specific. Mjekimi sipas simptomave.

Verjetje per perdorimin:

- Perzihet me produktet e tjera me perjashtim te atyre me reaksion alkalin.
- Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar stresje nga temperaturat e uleta, uitja e tepert, thatesire, e te jera.

NDIKIMI NE EKOSISTEM:

- Nuk eshte helmues ndaj bleteve.
- Eshte helmues ndaj peshqueve, prandaj mos ndotni ujrat me kete produkt ose ambalazhet e tij.

Magazinimi:

- Ruhet ne vende te sigura, pa lageshti dhe ne temperature 5 deri 35 grade celsius

Antidot specifik nuk nijhet, mjekimi simptomologjik.

Fitotoksiciteti: Nuk eshte fitotoksik ne dozat dhe kulturat e rekomanduara. Perzihet me shumicen e fungicideve dhe insekticideve perveç atyre me reaksion alkalin.
HELMUES PER PESHQIT DHE ORGANIZMAT UJORE.

Numri dhe data e regjistrimit: **447; 16/3/2012**

Data e prodhimit: **04.2014**

Afati i ruajtjes: **33**



Prodhues:

ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

Importues:
Tel: 0692053078



sh.p.k.
Shkoder