

**ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ**

**သတိပြုရန်**

- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ရုပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ မျက်ကာမှန်၊ အနားကျယ်သောဦးထုပ်၊ မျက်နှာဖုံး စသည့်အကာအကွယ်ဝတ်စုံများကို အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။
- မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
- ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ တွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
- ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆပ်ပြာနှင့် ဂရုတစိုက်စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မှ မဖျန်းရ။

**သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း**

- အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးခွံကို အမှီးတင်းကြပ်စွာပိတ်၍ သိုလှောင်ပါ။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
- ဆေးဘူးခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရပါ။ ထုမြေဖျက်ဆီး၍ မြေကျင်းနက်နက်တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများကို မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် မြောင်းများသို့ စွန့်မပစ်ရ။ မီးမရှို့ရပါ။
- လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးစေ့၊ ဓာတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသိုလှောင်ရ။

**ရှေးဦးသူနာပြုရန်**

- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေများများနှင့် ဖြေးညင်းညင်သာစွာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
  - ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသော အရေပြားအား ရေ၊ ဆပ်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
  - ဆေးရှူမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရရှိသော နေရာတွင် ထားပါ။
  - ဆေးကို မျိုချမိပါက အန်အောင်မပြုလုပ်ရ။ အညွန့်စားပါသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံနှင့်အတူ နီးစပ်ရာဆရာဝန်ထံ ဆေးကုသမှု အပြန်ဆုံး ခံယူပါ။
- မြေဆေး - မြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာအရ ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် **P2018-2466**  
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်  
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ  
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ



**TRIOMX 45 WP**  
**ထရိုင်းဂိုမက်(စ်)**  
**၄၅ ဒပလျူပီ**

**မို့သတ်ဆေး**

Active Ingredient : **Copper Oxychloride** .... 29%  
**Cymoxanil** ..... 4%  
**Mancozeb** ..... 12%  
Inert Materials : ..... 55%

ဆေးအုပ်စု - **Inorganic+Cyanoacetamide-oxime+Dithiocarbamate**



ဘရူနိုင်း ပရိတ်ဇေ(ထ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်  
(BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED)  
အမှတ်(၅၉/၆၁)၊ (မြို့အမှတ်-E)၊ မဟာဝိဇ္ဇာရိလမ်း၊ ပရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း



**ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD**  
75-83, DIMITAR MANOV STR., SOFIA 1408, BULGARIA

**1 kg**

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း GHS အုပ်စု(၅)



BURONOS **ပျော်ရွှင်ရာ ၈၀ ဒပလျူပီ**  
မို့သတ်ဆေး

**ဆေးမသုံးစွဲမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ**

ထရိုင်းဂိုမက်(စ်) ၄၅ ဒပလျူပီသည် သီးနှံပင်များတွင် ကျရောက်ဖျက်ဆီးတတ်သော ဗိုရေဂျီအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော ထိသောအာနိသင်ရှိသောဆေးဖြစ်ပါသည်။

**အသုံးပြုရန်အညွှန်း**

သီးနှံ	ကျရောက်သည့် ရောဂါ	နှုန်းထား		မတော်တရားစားသုံးမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည့်ပင်များ
		(ဂရမ်/ဧက)	ဂရမ်/ဧက ၂၀ လီတာ	
အာလူး	နောင်းပင်နာကျရောဂါ	၁၅၀-၃၀၀	၂၅-၅၀	၁၄
ခရမ်းချဉ်	စောပင်နာကျရောဂါ	၁၅၀-၃၀၀	၂၅-၅၀	၁၄
ငရုတ်	ပွဲမြောက်စွန်းရောဂါ	၁၅၀-၃၀၀	၂၅-၅၀	၁၄
ကြက်သွန်	တောက်တိုမြီးရောဂါ၊ ရွတ်မြောက်ရောဂါ	၁၅၀-၃၀၀	၂၅-၅၀	၁၄
ဂေါ်ဖီ	ရွတ်မြောက်ရောဂါ	၁၅၀-၃၀၀	၂၅-၅၀	၁၄
ဖရုံသခွားမွှား	ရွတ်မြောက်ရောဂါ	၁၅၀-၃၀၀	၂၅-၅၀	၁၄

- သီးနှံတစ်ရာသီတွင် ဆေးဖျန်းကြိမ်ရေ (၂-၃)ကြိမ်ထက် ပိုမဖျန်းပါနှင့်။
- ဆေးဖျန်းခြားရက် (၁၀-၁၄)ရက်
- ဆေးဖျန်းပြီးစိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၂၄)နာရီ
- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် (၆)နာရီခန့်ပိုင်းလွတ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။