

**PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN**

- Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.
- Apabila pestisida ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit.
- Apabila pestisida ini tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur.
- Apabila pestisida ini terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.

**PERAWATAN OLEH DOKTER**

- Tidak ada antidote yang spesifik.
- Perawatan diberikan sesuai dengan gejala yang timbul.

**PETUNJUK PENGGUNAAN**

**Ganero® 250 EC** dapat diaplikasikan secara tunggal atau dicampur dengan pupuk, perekat dan pestisida lainnya. Jika diperlukan, pencampuran dengan fungisida yang bersifat kontak sangat dianjurkan.

Tanaman	Dosis	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi
Kedelai	200 ml/ha	Penyemprotan dilakukan 2 kali pada umur 2-3 MST dan 6-7 MST (minggu setelah tanam)	Penyemprotan volume tinggi sebanyak 500 l/ha, menggunakan nosel berbentuk kipas.

No. Batch :  
 Bulan / Tahun Produksi :  
 Bulan / Tahun Kadaluausa :



# GANERO® 250 EC

Zat Pengatur Tumbuh bersifat sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air untuk memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen dengan *fungistatic effect*.



Bahan aktif : Piraklostrobin 250 g/l  
 Nomor pendaftaran : FL 01040120196373

Isi bersih:  
**100 ml**

**BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI**

**PERINGATAN BAHAYA**

Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan pernafasan.

**PETUNJUK KEAMANAN****SIMPAN DI TEMPAT KERING DAN JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

- Jangan makan, minum atau merokok pada waktu menggunakan pestisida ini.
- Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot pestisida ini, pakailah sarung tangan, topeng muka, pakaian ber lengan panjang dan ber celana panjang.
- Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun hingga bersih.
- Setelah digunakan, segera bersihkan dengan banyak air semua alat dan pakaian pelindung.
- Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan pestisida ini atau wadah bekasnya.
- Rusakkanlah wadah bekas dan kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 m dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air dan pemukiman.

**GEJALA DINI KERACUNAN**

- Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan badan, pusing atau mual.
- Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.



Pemegang Pendaftaran/Formulator:  
**PT. Zenith Crop Sciences Indonesia**  
 Gedung 18 Office Park Lt. 22  
 Jl. TB Simatupang No. 18 Jakarta 12520