

**SIMPAN DI TEMPAT KERING DAN JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

#### PERINGATAN BAHAYA

- Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan pernafasan.

#### PETUNJUK KEAMANAN

- Pada waktu menggunakan insektisida ini jangan makan, minum, atau merokok.
- Pakailah sarung tangan, baju berlengan panjang dan celana panjang, pelindung wajah dan penutup kepala.
- Jika terjadi kontaminasi, tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi insektisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air.
- Sebelum makan, minum, atau merokok cucilah tangan dan kulit yang terkena insektisida hingga bersih.
- Setelah bekerja cucilah pakaian kerja, topi dan pakaian pelindung lain, alat aplikasi/alat semprot, benda-benda lain yang terkena insektisida harus dicuci sampai bersih.
- Simpan insektisida ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat sejuk, aman, kering, tidak langsung terkena sinar matahari, terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Rusakkanlah wadah bekas dan kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 m dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air dan pemukiman.

#### GEJALA DINI KERACUNAN

- Air liur berlebihan, nafas tersengal-sengal, mabuk, pusing, mual, muntah, detak jantung melemah, serta badan gemetar.
- Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segeralah berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.



Pemegang Pendaftaran / Formulator:

PT Zenith Crop Sciences Indonesia  
18 Office Park Lantai 22  
Jl. TB Simatupang Kav.18  
Jakarta 12520



# IMIDASAL® 10 WP



## INSEKTISIDA

Insektisida sistemik racun kontak dan lambung berwarna putih berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air (*Wettable Powder*), untuk mengendalikan Hama Kutudaun (*Myzus persicae*) pada tanaman cabai dan Hama Kutu Kebul (*Bemisia tabaci*) pada tanaman kedelai.



Bahan Aktif: Imidakloprid 10%  
No. Pendaftaran: RI.01010120041976

Berat Bersih:  
**100 g**

**BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI**



#### PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Tanggalkan pakaian yang terkena insektisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.
- Apabila mengenai mata, basuh segera dengan air bersih selama 15 menit.
- Apabila insektisida ini tertelan dan penderita masih sadar, usahakan terus pemuntahan, segera bawa ke dokter.
- Apabila insektisida ini terhisap, bawalah penderita ke ruangan berudara segar.

#### PERAWATAN OLEH DOKTER

- Tidak ada antidote yang spesifik untuk insektisida ini.
- Perawatan terhadap keracunan yang ditimbulkan disesuaikan dengan gejala yang dialami penderita.

#### PETUNJUK PENGGUNAAN

Tanaman	Sasaran	Konsentrasi
Cabai	Hama Kutudaun ( <i>Myzus persicae</i> )	0,50 g/l
Kedelai	Hama Kutu Kebul ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0,75 g/l

#### CARA APLIKASI

- Penyemprotan dilakukan dengan volume tinggi : 400-800 l/ha, jika ditemukan serangga atau gejala serangannya pada tanaman dengan interval 10-14 hari atau sesuai rekomendasi setempat.
- Insektisida ini dapat dicampur dengan pupuk atau pestisida lainnya.

No. batch :

Bulan/tahun produksi :