

PERINGATAN BAHAYA

- Dapat menyebabkan keracunan melalui kulit dan pernafasan.

PETUNJUK KEAMANAN

- Jangan makan, minum, atau merokok pada waktu menggunakan fungisida ini.
- Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan, dan menyemprot fungisida ini, pakailah sarung tangan, masker, sepatu boot, pakaian berlengan panjang dan bercelana panjang.
- Cucilah dengan sabun tangan dan kulit yang terkena, sebelum makan, minum, atau merokok dan setelah bekerja.
- Setelah digunakan, bersihkanlah dengan baik semua alat, pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu boot, dan masker.
- Jangan mengotori kolam, perairan, dan saluran air dengan fungisida ini atau wadah bekasnya.
- Simpanlah fungisida ini tertutup rapat dalam wadah aslinya, di tempat sejuk, terkunci dan di luar jangkauan anak-anak.
- Rusaklah wadah bekas, kemudian kuburlah dalam tanah sekurang-kurangnya 0,5 meter.

GEJALA DINI KERACUNAN

- Dapat menyebabkan alergi pada kulit atau gangguan pernafasan.
- Apabila timbul satu atau lebih dari gejala di atas, segera berhenti bekerja, beri pertolongan pertama, dan bawalah penderita ke dokter.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

- Tanggalkan pakaian yang terkena fungisida dan cucilah bagian badan yang terkena dengan memakai air dan sabun yang banyak.
- Apabila mengenai mata, bilaslah segera dengan air bersih selama 15 menit.



Pemegang pendaftaran/formulator:

PT Zenith Crop Sciences Indonesia
18 Office Park Lantai 22
Jl. TB Simatupang Kav. 18
Jakarta 12520



PEROZIN[®] 80 WP

Extra Zn³⁺

FUNGISIDA

Fungisida bersifat kontak, berbentuk tepung berwarna putih kekuningan yang dapat disuspensikan dalam air, untuk mengendalikan penyakit Bercak Ungu (*Alternaria porri*) pada bawang merah dan Hawar Daun (*Phytophthora infestans*) pada kentang, dan Blast (*Pyricularia grisea*) pada padi.



Bahan Aktif: Zineb 80%
No. Pendaftaran: RI.01020120031788

Berat bersih:
1 Kg

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI



- Apabila tertelan dan penderita masih sadar, usahakan pemuntahan dengan cara memberi minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur.
- Apabila terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.

PERAWATAN DOKTER

- Bawalah segera penderita ke dokter terdekat. Perawatan dilakukan secara simtomatik sesuai dengan gejalanya.
- Tidak ada antidote yang spesifik.

PETUNJUK PENGGUNAAN

- **Perozin[®]** dapat disemprotkan secara tunggal atau dicampur dengan pestisida lain dan pupuk daun yang kompatibel.

Tanaman	Sasaran	Konsentrasi
Bawang merah	Bercak ungu (<i>Alternaria porri</i>)	2-4 g/l
Kentang	Hawar daun (<i>Phytophthora</i>)	3-4 g/l
Padi	Blast (<i>Pyricularia grisea</i>)	1-2 g/l

CARA APLIKASI

- Penyemprotan volume tinggi: 400-800 l/ha, menggunakan nosel berbentuk kipas.
- Penyemprotan dilakukan ketika ditemukan gejala penyakit, dapat diulangi dengan interval per minggu atau sesuai rekomendasi setempat.
- **Perozin[®]** dapat dicampur dengan fungisida dan insektisida lain.

No. batch :

Bulan/tahun produksi :

Perozin[®] diimpor dari Bulgaria