

比力奇®

盛田优农
MORITA YUHNOK

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
香蕉	叶斑病	250-350倍液	喷雾

使用技术要求：

- 1.在香蕉叶斑病发病前或发病初期及时施用。均匀喷湿叶面及叶背，施药间隔期为7-10天，连续施用3次。
- 2.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

3.每季最多使用3次，安全间隔期21天。



净含量：1千克

原产地：保加利亚
登记证持有人及生产企业：
齐尼思作物科学保加利亚有限责任公司
国内办事机构：住商农资（广州）有限公司
地址：广东省广州市天河区天河北路235号广州环贸中心4502室
电话：4008-322-329 传真：020-37812239



杀菌剂

代森锰锌

有效成分含量：350克/升
剂型：可分散油悬浮剂



产品性能：

1. 硫代氨基甲酸酯类杀菌剂，为代森锰和锌离子的配位络合物。采用化学方法制成，其中有效杀菌成分锰、锌离子以完全的络合结构存在，既结合了锌成分对作物的安全性，又可发挥锰成分的良好药效和缓慢释放，因此药效持效期较长，效果较稳定。
2. 杀菌机理为独特的多位点作用。

储存和运输方法：

1. 本品应以原包装贮存于阴凉、干燥和通风处；
2. 勿与食物、饮料、饲料、种子和肥料等其它商品同贮同运；
3. 加锁保管，避免儿童接触；
4. 存贮温度为0°C以上、40°C以下；
5. 运输时应注意防水防潮，避免雨淋；搬运时轻搬轻放，不可倒置。

杀菌剂

注意事项：

1. 使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液；施药期间不可吃东西和饮水；施药后应及时洗手和洗脸。
2. 本品对鱼类及水生生物有毒，免药液进入水体，注意远离虾、蟹养殖塘等水体施药，防止药液漂移污染邻近水域；不要在河塘、湖泊等水体中清洗施药器械。
3. 本品对桑蚕有毒，蚕室及附件禁用。
4. 鸟类自然保护区、桑园及蚕室附近禁用。
5. 建议与不同机制杀菌剂轮换使用。
6. 孕妇及哺乳期妇女避免接触。
7. 用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

中毒急救措施：

1. 中毒症状：恶心、呕吐、腹痛、腹泻，头痛、头晕、乏力，严重者可导致呼吸和循环功能衰竭加快，血压下降，呼吸抑制等，对眼睛和皮肤有刺激。
2. 如药液溅洒在眼中或皮肤上，应立即用清水冲洗。
3. 如误服或吸入，应立即催吐、洗胃和导泻，并将患者移至空气清新处，携此包装就医。

农药登记证号：PD20211455

产品质量标准号：WQ/359 ZENITH BG03-2021

农药生产许可证号：农药生许（鲁）0054

分装企业：山东省绿士农药有限公司

地址：山东省齐河经济开发区金能大道北首

电话：0534-5756113

传真：0534-5697717

邮编：251100

质量保证期：2年

生产日期、分装日期及批号：见包装

二维码



杀菌剂

BG-290001.S